ビタミンC製剤

ビタミンC2000「サトウ」



セルフメディケーションをサポートします HEALTHCARE INNOVATION



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。 また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

ビタミンC製剤

タミンC2000「サトウ」

- ●□の中で溶かしてのめる甘酸っぱいレモン味の黄色いチュアブル錠です。
- ●6錠でビタミンCを2,000mg 補給できます。
- ●しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着を緩和します。
- 肉体疲労・体力低下時のビタミンCの補給に役立ちます。



使用上の注意



相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って 医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関	係 部	位	症	状
- 34	11	哭	亜心・嘔吐	



(2)1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

2. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又 は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談く

下痢

- **〔効 能〕**●次の諸症状の緩和
- しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防:
- (スの場合のに囲いが) 歯ぐきからの出血、鼻出血 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」
- ●次の場合のビタミンCの補給 肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

〔用法·用量〕

1回服田量を餌 タにかみくだくか 口の中で溶かしながら服田します

年 齢	1回服用量	1日服用回数			
大人(15才以上)	1~3錠				
11~14才	1~2錠	20			
7~10才	1錠				
7才未満	服用しないでください				

★裏面につづく

〈用法・用量に関連する注意〉 (1)定められた用法・用量を厳守してください。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

「成分・分量と働き」 6錠中-

成 分	分 量	働き	
ビタミンC	800mg	皮ふのメラニン色素の生成を抑制し、しみ、そばかすの緩和に効果をあらわします。また、血管を強くする働きがあり、もくきからの出血、鼻出血の予防に効身をあらわします。	
ビタミンCナトリウム	1,349.82mg (ビタミンCとして 1,200mg)		
ビタミンB2酪酸エステル	6mg	ビタミンCと働きあって、しみ、そばかすなどの色素沈着の緩和に効果をあらわします。	

酸、アセスルファムK、ステアリン酸Mg、香料を含有します。

低、アとハルアが、ハナックをWill、音杯を含有しより。 (成分・分量に関連する注意) (1)本剤はビタミンB2酪酸エステルを含有するため、本剤の服用により、尿が 黄色くなることがあります。 (2)本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。 医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用しているこ とを医師に知らせてください。

●保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。 (3)他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

このような方におすすめです)

- ●しみ、そばかすが気になる方●歯ぐきからの出血や鼻血の出やすい方
- ●妊婦・授乳婦の方
- ●病中病後で体力が低下している方





(独)医薬品医療機器総合機構

本製品についてのお問い合わせは、お買い求め お店又は下記にお願い申し上げます。 佐藤製業株式会社 お客様相談窓口 電話 03(6412)7833 受付時間:9:00~17:00 (土.日.祝日を除く)

佐藤製薬株式会社 東京都港区元赤坂1丁目5番27号