

2011年7月作成

使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

乾燥肌、角化症の治療薬

ピアソンHPクリーム

第2類医薬品 血行促進・皮膚保湿剤

製品特長

- (1) 有効成分「ヘパリン類似物質」が持つ血行促進・皮膚保湿作用で、乾燥肌、角化症に優れた効果があります。
- (2) のびがよく、べたつかない、クリームタイプの製剤です。

本剤に尿素及びステロイド成分は配合しておりません。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。
出血性血液疾患（血友病、血小板減少症、紫斑病など）の人
2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）
(2) 出血のある傷口（血が止まりにくくなることがあります）



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 湿潤やただれのひどい人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- (2) 5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合

【効能・効果】

小児の乾燥性皮膚、乾皮症、手指の荒れ、しもやけ（ただれを除く）、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかざれ、きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり（顔面を除く）、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

（裏面もご覧ください。）

【用法・用量】

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼなどにのぼして貼ってください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

【成分・分量】（100 g 中）

成分名	分量	はたらき
ヘパリン類似物質	0.3 g	血行促進・皮膚保湿作用があり、乾燥肌、角化症に効果があります。

添加物として、セタノール、白色ワセリン、流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、モノステアリン酸ポリエチレングリコール、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸メチル、プロピレングリコール、D- ソルビトール液を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) メガネ、時計、アクセサリ等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (5) 使用期限（ケース及び容器に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。

【お問い合わせ先】

新新薬品工業株式会社 お客様相談室
電 話 076-435-0878
受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

販 売 元
新新薬品工業株式会社
〒930-2221 富山県富山市今市324番地

製造販売元
日医エフアーマ株式会社
富山市総曲輪1丁目6番21