

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。




タケダ漢方胃腸薬K

漢方製剤〈^{こうしゃへい い さん かしゃやく}香砂平胃散加芍薬〉

特 徴

第2類医薬品

- 弱った胃のはたらきを高める漢方処方「香砂平胃散」に、胃の痛みをしずめる生薬「芍薬」を加えた漢方胃腸薬です。
- 食べすぎ、飲みすぎによる胃もたれ、消化不良などにすぐれた効果をあらわします。
- 漢方製剤特有の香味をもった、淡かっ色の服用しやすい錠剤です。



⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

効 能

- 胃もたれ、胃部不快感、飲みすぎ、食べすぎ、食欲不振、胃炎
- 消化不良、胃部・腹部膨満感
- 胸やけ、げっぷ、胃痛、腹痛、さしこみ、悪心・嘔吐、下痢

用法・用量

次の量を、食後または食間に、水またはお湯で、かまずに服用すること。

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	3錠	3回
7歳～14歳	2錠	
7歳未満	服用しないこと	



＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。

(裏面へ続く)

成分 9錠(15歳以上の1日服用量)中に次の成分を含有する。

香砂平胃散加芍薬エキス	2,100mg(乾燥エキスとして)		
ソウジュツ(蒼朮)	2,000mg	タイソウ(大棗)	1,000mg
コウボク(厚朴)	1,500mg	コウブシ(香附子)	1,000mg
チンピ(陳皮)	1,500mg	シュクシャ(縮砂)	1,000mg
カンゾウ(甘草)	500mg	シャクヤク(芍薬)	1,500mg
ショウキョウ(生姜)	500mg		上記生薬より抽出


添加物：無水ケイ酸、ケイ酸Al、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、香料、乳糖水和物

＜成分に関連する注意＞

生薬を用いた製品なので、製品により錠剤の色調が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4) ビンの中の詰め物は、フタをあけた後はすてること(詰め物を再びビンに入れると湿気を含み品質が変わるものとなる。詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するためのものである)。
- (5) 服用のつどビンのフタをしっかりとしめること(吸湿し品質が変わる)。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (7) 箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入すること。
- (8) 一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用すること。



— たべすぎ、のみすぎなどで胃をこわしたら —

症状にあつた
胃腸薬を



消化のよい
やわらかい食べものを



お酒、タバコ、コーヒーは
がまん がまん!



包装 50錠、110錠

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社 ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」
〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号 ☎0120-567087
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

●タケダ健康サイト(パソコン用)

<http://takeda-kenko.jp>

●タケダ健康モバイルサイト(携帯電話用)

<http://tkdm.jp>

製造販売元



武田薬品工業株式会社

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号