

## ものもらい・結膜炎に

# 抗菌アイリスα

第2類医薬品

〈目薬〉

◆抗菌アイリスαは、細菌が原因で起こるものもらい・結膜炎などを効果的に治療する抗菌剤と、細菌感染による目の炎症をしずめる成分を配合した目薬です。

◆防腐剤が入っていない1回使いきりタイプで、しみないソフトなさし心地です。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

長期連用しないでください



### 相談すること

① 次の人は使用前に医師、薬剤師  
又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。  
はげしい目の痛み

② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ |
| 目    | 充血、かゆみ、はれ |

③ 3～4日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



## 効 能

ものもらい、結膜炎(はやり目)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかゆみ

こんな目の症状に

ものもらい



まつ毛の根もとやその付近に細菌が感染して炎症を起こしたもの。まぶたが赤くはれて、かゆみを伴います。

けつまくえん  
結膜炎  
(はやり目)



プールなどで感染するケースが多く、結膜(白目、まぶたの裏)が充血して、かゆみを伴います。

がんけんえん  
眼瞼炎  
(まぶたのただれ)



細菌感染などにより、まぶたのふちのはれやただれ、かゆみなどの症状があらわれます。

## 成 分

成 分

分 量

はたらき

スルファメトキサゾールナトリウム

4.0%

ものもらいや結膜炎の原因となる細菌に優れた抗菌作用をあらわします。

グリチルリチン酸二カリウム

0.25%

細菌感染などによる目の炎症をしずめます。

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

0.25%

角膜の乾燥を防いで、目を保護します。

タウリン

0.1%

目に栄養を与え、新陳代謝を促します。

添加物：ホウ砂、pH調節剤

〔注意〕


本剤の点眼後、口中に苦みまたは甘みを感じることがありますが、苦みは有効成分のスルファメトキサゾールナトリウムによるもの、甘みは有効成分のグリチルリチン酸二カリウムによるものですから、ご心配ありません。

用法・用量、保管及び取扱い上の注意については、裏面をよくご覧ください。

1日3～6回、1回2～3滴を点眼してください。

【使い方】

①無理にひっぱらず、キャップ部分をゆっくり回して開けてください。



②1日3～6回、1回2～3滴を点眼してください。(1本で両眼に点眼できます)



③容器には、薬液が押し出しやすいように、やや多く入っていますが、一度開封したものは、液が残っていても必ず捨ててください。

プラスチックとして分別してください。



【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)容器の先をまぶた、まつ毛にふれさせないでください。また混濁したものは使用しないでください。
- (4)ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5)点眼用에만使用してください。
- (6)無理にひっぱって開封しないでください。また、いきおいよく開封すると、薬液が飛び散ることがありますので注意してください。
- (7)本剤は「一回使いきりタイプ」の点眼剤で、防腐剤を含有しておりませんので、使用後の残液は捨ててください。



容器の先で目を傷つけないように注意してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)本剤は光による薬液の変質を防ぐため、着色容器・着色袋を使用しておりますが、保存する場合は箱に戻すなど、光のあたらない所に保管してください。なお、冷蔵庫では保管しないでください。
- (6)車のダッシュボード等高温下に放置しないでください。(容器の変形や薬液の品質が劣化することがあります)
- (7)ズボンの後ろポケット等に製品を入れると、キャップがあくことがありますので、注意してください。
- (8)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)



ものもらいについての注意

まぶたをこすったり、その他、目に刺激を加えないように注意してください。(なお、ものもらいは体質的に起こりやすい場合がありますが、過労や睡眠不足などで体力が低下しているときに起こりやすいので過労をさけ、睡眠を十分とるよう心がけましょう)

この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室  
電話 03-3985-1800  
受付時間 8:30～21:00(土、日、祝日を除く)

発売元

大正製薬株式会社  
東京都豊島区高田3丁目24番1号  
<http://www.taisho.co.jp>

製造販売元

ファーマパック株式会社  
富山県富山市小中163番地

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)