

服用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう保管してください。

ロートアルガード®鼻炎ソフトカプセルEX

**鼻炎用内服薬**

第②類医薬品

アレルギー性鼻炎などの鼻みず・くしゃみ・鼻づまりに効く!

# ロートアルガード® 鼻炎ソフトカプセルEX

●塩酸プソイドエフェドリン+dl-メチルエフェドリン塩酸塩配合

## ロートアルガード®鼻炎ソフトカプセルEXの特徴

花粉やハウスダストなどによるアレルギー性の鼻症状は大変つらいものです。不快症状が続くと、気分がすぐれず睡眠不足など日常生活にまで影響を及ぼしかねません。こんなときは、鼻みず、鼻づまりなどの鼻症状にすぐれた効き目のある「ロートアルガード®鼻炎ソフトカプセルEX」が効果的です。



## 使用上の注意 ⚠

### ●してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

#### 1. 次の人は服用しないでください。

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 次の症状のある人…………… 前立腺肥大による排尿困難
- (3) 次の診断を受けた人…………… 高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬)、塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬)

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある)

#### 4. 長期連用しないでください。

### ●相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 授乳中の人
- (4) 高齢者
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (7) 次の症状のある人…………… 高熱、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人…………… 緑内障
- (9) モノアミン酸化酵素系阻害剤(塩酸セレギリン等)で治療を受けている人

2. 次の場合は直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位  | 症 状                |
|-------|--------------------|
| 皮膚    | 発疹・発赤、かゆみ          |
| 消化器   | 悪心・嘔吐、食欲不振         |
| 精神神経系 | めまい、不眠、神経過敏、頭痛     |
| その他   | 排尿困難、顔のほてり、異常なまぶしさ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称              | 症 状                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィラキシー) | 服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、<br>顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、<br>息苦しさ等があらわれる。 |

(2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

口のかわき、便秘

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い

用法・用量

次の量を食後に水又はお湯で服用してください。

| 年齢    | 1回量     | 1日服用回数 |
|-------|---------|--------|
| 15才以上 | 1カプセル   | 3回     |
| 15才未満 | 服用しないこと |        |

(用法・用量に関連する注意)

(1) 用法・用量を厳守してください。

(2) カプセルの取り出し方

図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を  
指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して  
服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると  
食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成分・分量 (1日量：3カプセル中)

| 有効成分              | 配合量   |
|-------------------|-------|
| d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 6mg   |
| 塩酸プソイドエフェドリン      | 75mg  |
| dI-メチルエフェドリン塩酸塩   | 60mg  |
| グリチルリチン酸二カリウム     | 60mg  |
| ベラドンナ総アルカロイド      | 0.4mg |
| 無水カフェイン           | 90mg  |

添加物：ポリソルベート80、  
グリセリン脂肪酸エステル、  
サラシミツロウ、中鎖脂肪酸  
トリグリセリド、ゼラチン、  
グリセリン、酸化チタン

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
  - (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
  - (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
  - (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。
- なお、使用期限内であっても一度内袋を開封した後は、なるべく早くご使用ください。

お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

**ロート製薬株式会社**  
大阪市生野区巽西1-8-1

401072201