セルフメディケーションをサポートします HEALTHCARE INNOVATION

第3類 医薬品 ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。 また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



口腔咽喉薬

ストナ。 のどスプレー

ストナのどスプレーは…

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物がの どの炎症によるのどの痛みやはれを抑え、 セチルピリジニウム塩化物水和物がのどの 患部を殺菌します。

有効成分を直接のどに噴射塗布できます。 使いやすく、携帯に便利です。

- / 使用上の注意


∅ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 長期連用しないでください

(■ 相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3)次の症状のある人。 口内のひどいただれ
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感、吐き気



口の刺激感

4.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔効 能〕-

のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

〔用法·用量〕

1日数回、適量を患部に噴射塗布します。



〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)のどの炎症の場合には、のどの患部に噴射口を向けて、軽く息をはきながら、1回3~4噴射・1日3~5回を目安として使用してください。
- (2) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4) 小児に使用する場合には、保護者の指導監督のもとに使用してください。
- (5) 噴射塗布のみに使用し、内服しないでください。

〔ご使用方法 ── 最初にお使いになるときは薬液がでるまで4~5回押してください。



 容器のキャップを はずして、ノズル を反対方向にまわ すと、ポンプが作 動状態になります。



2. 口を開けてできるだけ口元に容器を近づけ、噴射 口をのどの患部に向けて、軽く息をはきながら 頭部を押してください。

1回3~4噴射・1日3~5回を目安としてご使用ください。

※噴射の際、液が気管支や肺に入らないように軽く息をはきながら噴射塗布してください。



3. 使用後はノズルを 元の位置に戻して キャップをしっか りはめてください。

[成分·分量と働き] 100mL中 -

成 分	分 量	働き	
アズレンスルホン酸ナトリウム 水和物(水溶性アズレン)	20mg	抗炎症作用によりのどの痛み、はれ を抑えます。	
セチルピリジニウム 塩化物水和物(CPC)	300mg	患部を殺菌します。	

添加物として、プロピレングリコール、グリセリン、ヒドロキシエチルセルロース、サッカリンNa、エタノール、リン酸水素Na、クエン酸、クエン酸Na、香料 (I-メントールを含む)を含有します。

●保管及び取扱い上の注意)

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所にキャップをして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5)使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。
- (6) 本剤使用後の一定時間は、呼気中に酒気帯び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用はお控えください。
- (7)本剤は青紫色の透明な液体ですので、衣服につなかいように注意してください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル) 本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの お店又は下記にお願い申し上げます。 佐藤製業株式会社 お客様相談窓口 電話 03(5412)7393

受付時間: 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

佐藤製薬株式会社

