

せき・たんに チミコデシロップN

リゾチーム塩酸塩配合 鎮咳去痰薬



セルフメディケーションをサポートします
HEALTHCARE INNOVATION

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

せき・たんに チミコデシロップN

リゾチーム塩酸塩配合 鎮咳去痰薬

チミコデシロップNは…

せきを鎮めるジヒドロコデインリン酸塩、*d,l*-メチルエフェドリン塩酸塩、南天実流工キス、クロルフェニラミンマレイン酸塩、からまるたんを出しやすくするリゾチーム塩酸塩、キキョウ流工キス配合の甘くてのみやすいシロップです。

！ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
1. 次の人は服用しないでください
本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります。)
4. 過量服用・長期連用しないでください
(倦怠感や虚脱感等があらわれるおそれがあります。)



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 乳児。(乳児において、本剤に含まれるリゾチーム塩酸塩を初めて服用した時に、ショック(アナフィラキシー)があらわれたとの報告があります。)
- (5) 高齢者。
(6) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(8) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(9) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害



2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精 神 神 経 系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。

- (2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください
便秘、口のかわり

★裏面ににつづく

【効 能】
せき、たん



【用法・用量】

下記の1回服用量を毎食後及び必要に応じて就寝前に服用します。
また、場合により1日6回まで服用できますが、その場合には約4時間の間隔を置いて服用してください。

年齢	成人(15才以上)	11～14才	8～10才	5～7才	3～4才	1～2才	3～11ヵ月	3ヵ月未満
1回 服用量	10mL	6.5mL	5mL	3mL	2.5mL	2mL	1mL	服用しないでください
1日 服用回数	3回							

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。(添付の計量カップをご使用ください)
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量と働き】60mL中

成 分	分 量	働 き
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せきの中枢に働いて、せきを鎮めます。
<i>d,l</i> -メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支をひろげ、せきを鎮めるとともに、たんを出しやすくし、呼吸を楽にします。
リゾチーム塩酸塩	60mg (力価)	粘りたなをうすめて、出しやすくします。
南天実流工キス	0.5mL (原生薬12gに相当)	せきを鎮める生薬です。
キキョウ流工キス	0.5mL (原生薬0.5gに相当)	からまるたんをうすめて、出しやすくする生薬です。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	抗ヒスタミン作用により、せきを鎮めます。
カフェイン水和物	90mg	中枢神経に作用して、他の成分の働きを助けます。

添加物として、D-ソルビトール液、L-グルタミン酸Na、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、安息香酸Na、パラベン、アルコール、プロピレングリコール、赤色2号、香料、パニリン、エチルパニリンを含有します。

【成分・分量に関連する注意】

本剤は、生薬エキスを配合していますので、わずかに濁りを生じることがありますが、効果には変わりありません。よく振ってから服用してください。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 服用後は、必ずビンの口をよく拭いてから、キャップを十分にしめて元の箱に入れ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 計量カップは、使用のつどよく水洗いして、本剤とともに清潔に保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (5) 使用期限(外箱及び容器に記載)をすぎた製品は、服用しないでください。



副作用検査費減制度のお問い合わせ先
(効) 薬 品 医 療 機 器 総 合 機 構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(6412)7383
受付時間 9:00～18:00 (土、日、祝日を除く)

発売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区三軒茶屋1丁目5番27号
製造販売元
福地製薬株式会社
滋賀県蒲生郡日野町寺尾624 ㊞