

龍角散 AZのどスプレー

！ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師または薬剤師に相談してください。

- (1) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状がある人：口内のひどいただれ

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師または薬剤師に相談してください。

- (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
口	刺激感
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

のどの炎症によるのどのあれ・のどのいたみ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

用法・用量

1 日数回適量を患部に噴射塗布してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 口を開けてできるだけ口元に容器を近づけのどの患部に噴射口を向けて、軽く息を出しながら噴射してください。
- (3) 噴射塗布のみに使用してください。
- (4) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、ただちに眼科医の診療を受けてください。
- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

成分・分量 (1mL中)

成 分	含 量
アズレンスルホン酸ナトリウム	0.2mg

添加物：L-メントール、クエン酸 Na、キシリトール、サッカリン Na、マクロゴール、エタノール

保管及び取扱い上の注意

- (1) 日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 薬液がこぼれ衣類等に付着した場合、水または洗剤で洗ってください。
- (5) 液が出ない時は、液が出るまでに数回空押ししてください。
- (6) 火気に近づけないでください。
- (7) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。