

漢方製剤

第2類医薬品

ドルチェ顆粒

本剤は芍薬と甘草の2味からなる製剤です。芍薬は平滑筋、骨格筋の痙攣と痙攣性疼痛を緩解する作用があります。また甘草は鎮痛、緩和の作用があり、芍薬と甘草を併用すると急迫症状や痙攣を緩解する効果があるため、腹痛及び手足がひきつれて痛み、またその他の急激に起こった筋肉の痙攣による痛みにも頓服として用いられます。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1) 生後3ヵ月未満の乳児
- (2) 次の診断を受けた人
心臓病

2. 症状があるときのみの服用にとどめ、連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 次の症状のある人
むくみ
- (5) 次の診断を受けた人
高血圧、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。
うつ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

■ 効能・効果

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：
こむらえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

■ 用法・用量

次の量を1日2～3回服用する。

年 齢	1回服用量
成人(15歳以上)	1包(2g)
7歳以上15歳未満	2/3包
4歳以上 7歳未満	1/2包
2歳以上 4歳未満	1/3包
生後3ヵ月以上2歳未満	1/4包

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
2. 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

■ 成分・分量：本品3包(1包2g)中

芍薬甘草湯エキス2.4g

成 分	含 量
日局 シャクヤク	6g
日局 カンゾウ	6g

より製した乾燥エキス

添加物：乳糖、バレイショデンプン、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg

■ 保管及び取り扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります)。
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

■ お客様相談室

TEL 06-6131-1300(祝祭日を除く 月～金曜日 10:00～17:00)

製造販売元

株式会社 阪本漢法製薬

大阪市北区曽根崎2丁目7番4号
<http://www.sakampow.com>