

五苓散料 A エキス細粒「分包」 三和生薬

五苓散料 A エキス細粒「分包」 三和生薬は、漢方処方「五苓散」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1 ヶ月位（急性胃腸炎、二日酔に服用する場合には 5～6 回、水様性下痢、暑気あたりに服用する場合には 5～6 日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成 分

本品 1 日量 …………… 3 包（1 包 2.0 g）中
五苓散料 A 水製エキス …………… 3.8 g

タクシャ …………… 6.0 g	ビャクジュツ …… 4.5 g
チヨレイ …………… 4.5 g	ケ イ ヒ …………… 3.0 g
ブクリヨウ …………… 4.5 g	

添加物として乳糖、セルロース、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸 Ca、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室
東京都千代田区外神田 6-6-1
T E L 03-3834-2171（代）

（月～金曜日 10：00～17：00 但し祝日を除く）

適応症

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：

水様性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹^注）のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔

〈適応症に関連する注意〉

注：しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことである。

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果には変わりございません。

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15 才以上）	1 包
7 才～14 才	2/3 包
4 才～ 6 才	1/2 包
4 才 未 満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。



三 和 生 薬 株 式 会 社
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1