第2類医薬品

ご使用に際しては、説明文書を必ずお読み下さい。 また、必要な時に読めるように保管して下さい。

品番 149

# サンワ 酸棗仁湯 エキス錠

サンワ酸棗仁湯エキス錠は、漢方処方「酸棗仁湯」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



#### 使用上の注意



## 相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 胃腸の弱い人。
  - (4) 下痢又は下痢傾向のある人。
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位		症	状
消化器	吐き気、	食欲不振、	胃部不快感

- 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること下痢
- 4.1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### 適応症

体力中等度以下で、心身が疲れ、精神不安、不眠などがあるものの次の諸症:

不眠症、神経症

## 用法·用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量		
大人(15才以上)	6 錠		
7才~14才	4 錠		
5才~ 6才	3 錠		
5才 未 満	服用しないこと		

## 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに 服用させること。

## 成 分

本品1日量 ······· 18錠 (1錠 0.3g) 中酸素仁湯水製エキス ····· 1.9g

 チ モ ……
 2.4g

 センキュウ ……
 2.4g

 ブクリョウ ……
 4.0g

 カンゾウ ……
 0.8g

 サンソウニン ……
 8.0g

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、メタケイ酸アルミン酸 Mg、ステアリン酸 Ca を含有する。

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 乾燥剤は捨てないこと。また、誤って飲み込まないようにすること。

#### お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店 又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室 東京都千代田区外神田 6-6-1 TEL 03-3834-2171(代) (月〜金曜日 10:00~17:00 但し祝日を除く)

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が 異なることもございますが、効能・効果にはかわりございま

せん。



三 和 生 薬 株 式 会 社 栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1