

はんげびやくじゅつてんま とう

半夏白朮天麻湯 A エキス錠 三和生薬

半夏白朮天麻湯 A エキス錠 三和生薬は、漢方処方「半夏白朮天麻湯」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1 ヶ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成 分

本品 1 日量 …………… 18 錠（1 錠 0.35 g）中

半夏白朮天麻湯 A 水製エキス …………… 2.9 g

ハ ン ゲ …………… 1.8 g	シ ン キ ク …………… 1.2 g
ビ ャ ク ジ ュ ツ …… 1.8 g	オ ウ ギ …………… 0.9 g
チ ン ビ …………… 1.8 g	ニ ン ジ ン …………… 0.9 g
ブ ク リ ョ ウ …… 1.8 g	タ ク シ ャ …………… 0.9 g
バ ク ガ …………… 1.2 g	オ ウ バ ク …………… 0.6 g
テ ン マ …………… 1.2 g	カ ン キ ョ ウ …… 0.6 g
シ ョ ウ キ ョ ウ …… 0.3 g	

添加物として乳糖、セルロース、部分アルファ化デンプン、カルメロース Ca、カルメロース、ステアリン酸 Ca、無水ケイ酸、メタケイ酸アルミン酸 Mg を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 乾燥剤は捨てないこと。また、誤って飲み込まないようにすること。

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室

東京都千代田区外神田 6-6-1

T E L 03-3834-2171（代）

（月～金曜日 10：00～17：00 但し祝日を除く）

適応症

体力中等度以下で、胃腸が弱く下肢が冷えるものの次の諸症：

頭痛、頭重、立ちくらみ、めまい、蓄膿症（副鼻腔炎）

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15 才以上）	6 錠
7 才～14 才	4 錠
5 才～ 6 才	3 錠
5 才 未 満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三 和 生 薬 株 式 会 社
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1