

ま し にん がん りょう  
サンワ 麻子仁丸料 エキス錠

サンワ麻子仁丸料エキス錠は、漢方処方「麻子仁丸」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと  
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状            |
|------|----------------|
| 消化器  | はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |

  - (2) 5～6 日間服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること  
下 痢

成 分

本品 1 日量 …………… 18 錠（1 錠 0.3 g）中  
麻子仁丸料水製エキス …………… 2.1 g

|       |     |
|-------|-----|
| マシニン  | 5 g |
| シャクヤク | 2 g |
| キ ジ ツ | 2 g |
| コウボク  | 2 g |
| ダイオウ  | 4 g |
| キョウニン | 2 g |

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルスターチ、ステアリン酸 Ca、カルメロース、セルロースを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社  
TEL 03-3834-2171（代）

適応症

体力中等度以下で、ときに便が硬く塊状なものの次の諸症：  
便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

| 年 令        | 1 回 量   |
|------------|---------|
| 大人（15 才以上） | 6 錠     |
| 7 才～14 才   | 4 錠     |
| 5 才～6 才    | 3 錠     |
| 5 才 未 満    | 服用しないこと |

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。



三 和 生 薬 株 式 会 社  
宇都宮市平出工業団地 6－1

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。