

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面に記載)を過ぎた製品は服用しないこと


四十肩、五十肩に シジラック錠

販売名: シジラック

漢方製剤 第2類医薬品

特 徴

- 痛くてつらい四十肩、五十肩を体の中から飲んで治す漢方薬です
- 四十肩、五十肩にともなう肩関節の炎症を鎮めます
- 携帯に便利な1包4錠入り個包装です



⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (5) 発汗傾向の著しい人
 - (6) 高齢者
 - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみなどを起こしたことがある人
 - (8) 次の症状のある人: 排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

3. 1ヶ月くらい服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効能・効果

体力中等度またはやや虚弱なものの次の諸症：四十肩、五十肩、肩こり、寝ちがえ

用法・用量

次の量を食前または食間に水またはお湯で服用してください

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	4錠	3回
7才以上15才未満	3錠	
5才以上7才未満	2錠	
5才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守すること
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
- 食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

成分・分量

1日量(12錠)中 独活葛根湯エキス…2860mg

<原生薬換算量>

カッコン ……2.5g	ケイヒ ……1.5g	シャクヤク ……1.5g
マオウ ……1.0g	ドクカツ ……1.0g	ショウキョウ ……0.5g
ジオウ ……2.0g	タイソウ ……0.5g	カンゾウ ……0.5g

添加物として、二酸化ケイ素、CMC-Ca、タルク、ステアリン酸Mg、セルロースを含有する

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管すること
- (2)小児の手の届かないところに保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)本剤をぬれた手で扱わないこと
- (5)1包を分割して服用する場合、残った薬剤は袋の口を折り返して保管すること
また、保管した残りの薬剤は、その日のうちに服用するか捨てること

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします



発売元

小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)

☎0120-5884-01

受付時間9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元

小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3