

複方毒掃丸

第2類医薬品

複方毒掃丸は、6種類の生薬すべてが、日本薬局方の規格に適合する原料を配合した穏やかな便秘治療薬です。それぞれの作用がひとつになって、便秘や便秘に伴う症状を改善します。小さな丸薬ですから飲みやすく、3歳のお子様からお年寄りの方まで症状に合わせて服用量を調節できます。

成分の働き

- ダイオウ・エイジツの緩下作用により、大腸の働きを活発にして自然なお通じを促します。
- サンキライの皮膚疾患の排膿・解毒作用により、吹出物・肌あれを抑えます。
- コウボクには胃や腸の働きをよくする作用があり、食欲不振・腹部膨満・腸内異常醗酵に効果があります。
- カンゾウの鎮痛緩和作用により、お腹の痛みや痔等の不快感を抑えます。
- センキュウの補血作用により、血液の循環をよくし、のぼせ・頭重をやわらげます。

使用上の注意

してはいけないこと



守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

1. 本剤を服用している間は、他の瀉下薬(下剤)を服用しないで下さい。
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
3. 大量に服用しないで下さい。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる婦人。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) はげしい腹痛、悪心・嘔吐のある人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

- (2) 1週間位服用しても症状がよくなる場合。
3. 下痢の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 誤用の原因になったり品質が変わることがありますので、他の容器に入れ替えないで下さい。
- (4) 生薬を原料としていますので、製品の色や味等が多少異なることがあります。

成分の働き

大黃・ダイオウ

緩下作用により、大腸の働きを活発にして自然なお通じを促します。

宮実・エイジツ

ダイオウと共に、大腸の働きを活発にして自然なお通じを促します。

山帰来・サンキライ

皮膚疾患の排膿・解毒作用により、吹出物・肌あれを抑えます。

川芎・センキュウ

補血作用により、血液の循環をよくし、のぼせ・頭重をやわらげます。

甘草・カンゾウ

鎮痛緩和作用により、お腹の痛みや痔等の不快感を抑えます。

厚朴・コウボク

胃や腸の働きをよくする作用があり、食欲不振・腹部膨満・腸内異常醗酵に効果があります。

複方毒掃丸

成分・分量 1日量・90丸中

日局ダイオウ末：1.2g 日局センキュウ末：0.5g

日局エイジツ末：0.8g 日局カンゾウ末：0.5g

日局サンキライ末：0.8g 日局コウボク末：0.4g

添加物：寒梅粉、沈降炭酸カルシウム、カルメロー
スカルシウム、薬用炭、タルク。

本剤の服用により、尿が着色(黄褐色～赤褐色)することがありますが、これはダイオウによるものですから心配ありません。

用法・用量

15歳以上 1回 15～30丸

7歳以上15歳未満 1回 10～20丸

3歳以上7歳未満 1回 5～10丸

1日3回食前に服用して下さい。

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態を
みながら少しずつ増量又は減量して下さい。

(1)用法・用量を厳守して下さい。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の
指導監督のもとに服用させて下さい。

(3)3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤が
のどにつかえないよう、よく注意して下さい。

効能・効果

便秘・便秘に伴う次の症状の緩和：吹出物、肌あれ、
食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔、
のぼせ、頭重。

6包 180丸

第2類医薬品

製造販売元



株式
会社

山崎帝國堂

千葉県柏市豊四季73番地1

本社 東京都中央区日本橋2丁目1番3号

お客様相談係

☎04-7148-3412 代表

受付時間 9:00～16:30

(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931