



漢方薬

つらい排尿痛、残尿感に炎症を抑え、菌を押し流す

11種類の生薬からなる漢方処方

ボーコレン

ボーコレンは11種類の生薬からなる漢方処方「五淋散」です。尿道や膀胱などに違和感を感じ、排尿痛、残尿感、頻尿などのつらい症状を徐々に緩和していきます。

11種類の生薬からなる漢方処方
ボーコレン

漢方製剤
第2類医薬品

服用に際して、この説明書を必ずお読みください
使用期限(パッケージ下部に記載)を過ぎた製品は服用しないこと

販売名:ボーコレン(Urination pain medicine)

⚠ 使用上の注意

相談すること 1.次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦または妊娠していると思われる人(3)胃腸が弱く下痢しやすい人(4)高齢者(5)次の症状のある人:むくみ(6)次の診断を受けた人:高血圧、心臓病、腎臓病 2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛などがあらわれる

(2)1ヶ月くらい服用しても症状がよくならない場合 3.長期連用する場合には、医師または薬剤師に相談すること 4.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること:下痢

効能・効果 体力中等度のものの次の諸症:頻尿、排尿痛、残尿感、尿のにごり

用法・用量 次の量を食前または食間に水または白湯で服用してください

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	4錠	3回
7才以上15才未満	3錠	
5才以上7才未満	2錠	
5才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>
○定められた用法・用量を厳守すること
○小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
※食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2〜3時間後のことをいいます

成分・分量 1日量(12錠)中 五淋散料エキス・・・2.55g

<原生薬換算量> ブクリョウ3.0g、トウキ1.5g、オウゴン1.5g、カンゾウ1.5g、シャクヤク1.0g、サンシシ1.0g、ジオウ1.5g、タクシャ1.5g、モクツウ1.5g、カッセキ1.5g、シャゼンシ1.5g

添加物として、無水ケイ酸、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、セルロースを含有する

保管および取り扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところにチャックをしっかりとめて保管すること(2)小児の手の届かないところに保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)本剤をぬれた手で扱わないこと

発売元
小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
製品のお問い合わせ先
お客様相談室 ☎06(6203)3625
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
ホームページアドレス <http://pr.kobayashi.co.jp>

製造販売元
小林製薬株式会社
〒567-0057
大阪府茨木市豊川1-30-3
MADE IN JAPAN
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931