

コンドロイチンZS錠

〔特 徴〕

痛みは生体への注意信号でもあり、重要な生理現象ですが、放置しておく和不快な症状が続き、日常生活などに支障をきたしてしまいます。特に関節の痛み、腰の痛みなどは加齢とともに起こりやすく、健康的な生活を送る上でこのような症状の改善は大切な事です。

コンドロイチン硫酸ナトリウムは身体中にある物質で、特に関節軟骨や血管、角膜などに多く存在しており、身体の弾力性保持や物理的なクッションの役割、また保水性などの働きをもっています。さらに、細胞の新陳代謝（栄養を取り入れたり、老廃物を排泄したりすること）を活発にします。

こんな方に

階段の昇り降りが苦痛な方、立ったり座ったりがづらい方、冷えると痛む方、疲れてくると腰が重くなる方、重いものを持ち上げて腰を痛めたことがある方、肩が上がらない・引っかかる感じがする方、疲れがなかなか取れない方。季節の変わり目に関節痛や神経痛を起こす方、最近耳が聞こえにくくなったという方、騒音の多い環境にいる方。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	下痢、悪心、胃部不快感

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

〔効能・効果〕

関節痛、神経痛、腰痛、五十肩、神経性難聴、音響外傷性難聴、疲労回復

〔用法・用量〕

1回2錠，1日3回服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児には服用させないでください。
- (3)服用時に錠剤をそのまま口中に入れると，口中に付着することがあります。
多めの水又はぬるま湯と一緒に服用してください。
- (4)食前・食後，いずれの服用でもかまいません。

〔成 分〕 1錠中

成 分	分 量
コンドロイチン硫酸ナトリウム	260mg

添加物として，乳糖水和物，合成ケイ酸アルミニウム，サッカリンナトリウム，カルメロースカルシウム，ステアリン酸マグネシウム及び香料を含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

本剤のご使用により，変わった症状があらわれるなど，何かお気付きの点がございましたら，お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室

TEL 03-3661-2080 (ダイヤルイン)

受付時間 9:00～17:50 (土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

フリーダイヤル ☎0120-149-931



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

コンドロイチンZS錠はゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



Self-Medication

D08N

コンドロイチンZS錠