



* 2012年12月改訂(記載要領変更に伴う改訂)

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。



タケダ漢方胃腸薬A末〈分包〉

漢方製剤〈安中散〉

特 徴

第2類医薬品

- 漢方処方「安中散」の製剤で、神経性胃炎にすぐれた効果をあらわします。
- 弱った胃のはたらきを高め、慢性胃炎、胃腸虚弱にすぐれた効果をあらわします。
- ふだんから胃腸の弱い人に、好適な胃腸薬です。
- 芳香のあるかっ色の服用しやすい細粒状の製剤です。
- 携帯に便利な分包(アルミ包装)です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

効 能

体力中等度以下で、腹部は力がなくて、胃痛または腹痛があって、ときに胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、はきけ、嘔吐などを伴うものの次の諸症：
神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱

用法・用量

次の量を、食前または食間に、水またはお湯で服用すること。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
15歳以上	1 包	3 回
7 歳～14歳	2/3包	
7 歳未満	服用しないこと	



＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。

(裏面へ続く)

成分 3包(2.1g、15歳以上の1日服用量)中に次の成分を含有する。

あんちゅうさんりょう

安中散料エキス 480mg(乾燥エキスとして)

ケイヒ	750mg	シュクシャ	500mg
エンゴサク	750mg	カンゾウ	500mg
ボレイ	750mg	リョウキョウ	250mg
ウイキョウ	500mg	上記生薬より抽出	

あんちゅうさん

安中散 1,500mg

ケイヒ	281.25mg	シュクシャ	187.5mg
エンゴサク	281.25mg	カンゾウ	187.5mg
ボレイ	281.25mg	リョウキョウ	93.75mg
ウイキョウ	187.5mg		


添加物：ケイヒ油、ウイキョウ油、香料、トウモロコシデンプン

＜成分に関連する注意＞

生薬を用いた製品なので、製品により末の色調が多少異なることがありますが、効果にはかわりありません。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社 ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」

〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号 ☎0120-567087

受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

●タケダ健康サイト(パソコン用)

<http://takeda-kenko.jp>

●タケダ健康モバイルサイト(携帯電話用)

<http://tkdm.jp>

製造販売元  **武田薬品工業株式会社**

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号