

胃腸薬

キャベジン[®]細粒

私たちの食生活は年々よくなってきており、平均寿命も伸びています。ところが、その反面、おいしいものが何でも食べられるために、食べ過ぎたり、お酒を飲みすぎたりして、胃や腸などの消化器系諸臓器に負担がかかり、年齢と共に弱ってくるこれら諸臓器の寿命に悪い影響を与えているケースが増えてきているのです。キャベジン[®]細粒は、このような胃や腸などの諸臓器を元気に修復し、正常に整えるためのお薬で、粘膜のすぐれた修復成分であるMMSC(メチルメチオニンスルホニウムクロライド)を1日量として150mg配合してあります。おのみになっていると、弱ってきた胃や腸などの諸臓器は、次第に正常な状態に整えられてまいります。サラサラの細粒状ですから、大変のみやすく、どこへでもお持ちいただけます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある。)
4. 長期連用しないこと

🗣 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
排尿困難
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 2週間間服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
口のかわき

📌 その他の注意

母乳が出にくくなることもある。

■効能・効果

胃酸過多、胸やけ、げっぷ、胸つかえ、胃部不快感、胃重、胃痛、胃部・腹部膨満感、もたれ、嘔吐、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、飲みすぎ、食べ過ぎ、食欲不振、胃弱、消化不良、消化促進

■用法・用量

下記の量を毎食後水又は温湯で服用すること。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1包	3回
11歳以上15歳未満	2/3包	
8歳以上11歳未満	1/2包	
8歳未満の小児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

■成分・分量（3包中）

成 分		分 量
粘膜修復成分	メチルメチオニンスルホニウムクロライド	150mg
制酸成分	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈物	1370mg
	酸化マグネシウム	330mg
	ロートエキス3倍散（ロートエキスとして30mg）	90mg
健胃成分	ウイキョウ末	300mg
	ショウキョウ末	100mg
	チョウジ末	50mg
消化成分	ビオチンアスターゼ2000	30mg

〔添加物〕硬化油、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、メチルセルロース、センプリ、L-メントール、香料、トウモロコシデンプン、デキストリン

■保管及び取り扱い上の注意

- (1)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4)1包を分割した残りを服用する場合、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
- (5)使用期限（外箱に記載）をすぎた製品は服用しないこと。

本製品に関するお問い合わせは
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間：月～金（祝日を除く）9:00～17:00



製造販売元 興 和 株 式 会 社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14