

女性用薬

メスコン-S T

この添付文書は服用前に必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように保存しておいて下さい。

第2類医薬品

女性にとって一番うれしい事は順調に月経のあることで、毎月々決まった日取りに女性に生まれた喜びがよく感じられるのであります。反対に最も悲しい事はそれが正調でなく不順であったりすることです。女性にとって月経の不順ほど不快で悲しいことはありません。体の普通の時はそれ程までに痛切には感じませんが、それが不順になりますと人知れず本当に困ってしまいます。弊社は婦人科、特に女性の生理についてくわしく研究いたしております。そしてメスコン-S Tを月経不順の方々にのおくり出来る事をこの上ない喜びと考えております。

⚠ 使用上の注意

⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

👤相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (5) 高齢者
 - (6) 次の症状のある人
むくみ
 - (7) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、 まぶたが重くなる、手がこわばる、血 圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1ヶ月位(便秘に服用する場合には5～6日間)服用しても
症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること
4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の
継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は
薬剤師に相談すること
下痢

用法及び用量

次の量を、食間に水またはお湯で、かまずに服用すること

年 令	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	2カプセル	3回
15才未満	服用しないこと	

※「食間」とは、食後2～3時間を指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい
- (2) カプセルの取り出し方
右図のようにカプセルの入って
いるPTPシートの凸部を指先で
強く押して裏面のアルミ箔を破
り、取り出してお飲み下さい。
(誤ってそのまま飲み込んだり
すると食道粘膜に突き刺さる等
思わぬ事故につながります。)



※裏面を必ず一読下さい。

成分及び分量日量(6カプセル中)

ダイオウ	RHEI RHIZOMA	1.50 g	} 水製エキス 1.75 g
キジツ	AURANTII FRUCTUS IMMATURUS	1.50 g	
トウキ	ANGELICAE RADIX	1.50 g	
乾燥硫酸ナトリウム	NATRII SULFAS SICCATUS	0.88 g	
コウボク	MAGNOLIAE CORTEX	1.00 g	
チンピ	AURANTII NOBILIS PERICARPium	1.00 g	
モクツウ	AKEBIAE CAULIS	1.00 g	
コウカ	CARTHAMI FLOS	1.00 g	
ソボク	SAPPAN LIGNUM	1.00 g	
カンゾウ	GLYCYRRHIZAE RADIX	1.00 g	

※添加物として、トウモロコシデンプン、軽質無水ケイ酸、ゼラチン、青色1号、赤色3号、黄色5号、ラウリル硫酸ナトリウム、亜硫酸水素ナトリウム、酸化チタンを含有する。

効能又は効果

比較的体力があり下腹部に圧痛があって、便秘しがちなものの次の諸症

月経不順、月経痛

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- (2)小児の手の届かない所に保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと
(誤用の原因になったり品質が変わる)

消費者相談窓口

1. 購入された薬局、薬店
2. 芳香園製薬株式会社
香川県綾歌郡宇多津町浜八番丁134番地5
電話:0877-49-0021
(午前9時から午後5時まで 土、日、祝日を除く)

Ⓢ 芳香園製薬株式会社
香川県綾歌郡宇多津町浜八番丁134番地5