

外皮用殺菌消毒剤

スリ傷・キリ傷をサラサラにして殺菌・消毒

新キズドライ



- ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また必要なときに読めるよう大切に保管してください。
- 使用期限(パッケージ底面および缶底に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

スリ傷・キリ傷をサラサラにして殺菌・消毒

新キズドライ

販売名：新キズドライ


殺菌消毒薬 第2類医薬品

パウダースプレー


特記事項

- (1)新キズドライを使用する前に必ず、水道水等のきれいな水で患部の汚れを充分洗い流すこと。
(十分に洗浄しないで使用すると、患部に汚れが残り化膿する恐れがあります。)
- (2)患部が広範囲にわたるキズや、深いキズ、やけどの場合は、本剤を使用しないこと。
- (3)重ね塗りをしないこと。
- (4)同じ箇所に繰り返し使用する場合は、ぬるま湯等で患部をきれいに洗い、付着している薬剤を除去してから使用すること。(薬剤の除去が困難になり、治癒を遅らせてしまうことがある。)


使い方



①傷口には土や泥等の汚れが付着しています。水道の蛇口を一杯に開いて、きれいに洗い落としてください。




②出血が多い時はティッシュペーパー等で軽く拭き取ってください。



③使用前によく振って、傷口から10cmぐらい離し、缶を正立または倒立の状態で使用してください。

特徴

- 殺菌・消毒**: 刺激が少なく皮ふにやさしい優れた殺菌力を持つ殺菌消毒剤「イソプロピルメチルフェノール」が傷口を殺菌消毒し、化膿を防ぎます。
- 痛みを鎮める**: 局所麻酔剤「ジブカイン塩酸塩」が痛みを鎮めます。
- 皮ふ形成を促進**: 「アラントイン」の創傷修復作用により、創傷面の皮ふ形成を促進し、傷の治りを早めます。
- パウダーが傷口をサラッとさせます。**



⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

(1) 患部が広範囲の人、深い傷や出血が多い人、やけどの人(洗浄が充分に行き届かず、化膿したり、治癒が遅れたりする場合があります) (2) 2歳以下の乳幼児(皮膚組織の発達が未熟なため、発赤などの炎症をおこす場合があります)

2. 次の部位には使用しないこと

(1) 顔面 (2) 粘膜(例えば、目、唇、口の中、鼻の穴、耳の中、肛門、性器など)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 本人または家族がアレルギー体質の人 (3) 薬や化粧品、ゼラチンなどによりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状が現れた場合

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります
その場合は直ちに医師の診療を受けること

関係部位	症 状
皮膚	腫れ、いたみ、熱感、 発疹・発赤、かゆみ

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ、発疹、不快感、悪心、口内の のれ、しみる、灼熱感、または口内の刺激とともに顔色が青白く なり、手足が冷たくなり冷汗、息苦しさなどがあらわれる

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

用法・用量

1日数回、患部に適量を噴射する

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (3) 目や口に入らないように注意すること 万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けること また、口に入った場合はすぐにうがいをし、医師の診療を受けること (4) 外用にのみ使用すること (5) 使用前に缶をよく振ること (6) 凍傷などの恐れがあるので、同じ箇所に連続して1秒以上噴射しないこと (7) 患部まで約10cmの距離で噴射すること

●「特記事項」の項をよく読むこと

成分・分量 (100g中)

成 分	分 量
イソプロピルメチルフェノール	0.15g
ジブカイン塩酸塩	0.045g
アラントイン	0.15g

添加物として、ベンザルコニウム塩化物、ゼラチン、トウモロコシデンプン、白糖、スクワラン、LPGを含有する

効能・効果

きり傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

保管および取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップを閉めて保管すること
(2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 火気に近づけないこと
●車内や直射日光のあたる場所、暖房器具(ストーブやファンヒーターなど)の付近などには、温度が上がって破裂する危険があるため置かないこと ●水まわりや湿気の多い場所では缶がサビて穴があき、破裂することがあるので置かないこと



発売元

小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-3-6

製品のお問い合わせ先

お客様相談室 ☎06(6203)3625

受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

ホームページアドレス <http://pr.kobayashi.co.jp>

製造販売元

小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN

10064941