使用に際して、この添付文書を必ずお読みください また必要なときに読めるよう大切に保管してください 使用期限(パッケージ底面およびチューブ底に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

赤ゃ茶色の傷あと、もり上がりのぁる傷あとなどを目立たなくする

アットノン


外皮用薬 非ステロイド剤 第2類医薬品

販売名:アットノン

製品特徴

傷あととは、傷ができたあと傷口を修復する時に皮ふ組織が異常に増殖することでできる赤み(つっぱり)などやもり上がり(しこり)のことです

1. アットノンは、有効成分へパリン類似物質が血流の循環を良くして皮ふの新陳代謝を促進し、皮ふの炎症を鎮めて皮ふ自体の正常化機能を回復させ、角質に水分を保持させ柔軟性を取り戻すことで、傷あとを改善していきます



① 血行促進作用 血流の循環を良くして、皮ふの 新陳代謝を促進します

②抗炎症作用 皮ふの炎症を鎮めて、皮ふ自体の 正常化機能を回復させます

③水分保持作用 角質に水分を保持させ、柔軟性 を取り戻します

2.サラッとした透明ジェルタイプの塗り薬です

- 小使用上の注意-

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1.次の人は使用しないこと
- 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人
- 2.次の部位には使用しないこと
- 目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻腔、膣など)

相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)本人または家族がアレルギー体質の人
 - (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4)湿潤やただれのひどい人
- 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること
 - (1)使用後、次の症状が現れた場合

関係部位	症	状
皮ふ	発疹・発赤、	、かゆみ、はれ

(2)5~6日間使用しても症状が良くならない場合

効能・効果

きず・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱり(顔面を除く)、ひじ・ひざ・かかと・ くるぶしの角化症、手指の荒れ、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮ふ、 しもやけ(ただれを除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

用法·用量

- 1日1〜数回、適量を患部にすりこむか、またはガーゼなどにのばして貼ってください
- <用法・用量に関連する注意>
 - 使用のつどキャップをしっかりしめること
 - 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
 - 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと

なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること

- 外用にのみ使用すること
- ※ 出血のある傷口には使用しないこと(血が止まりにくくなることがある)
- ※ かさぶたには使用しないこと
- ※ 顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないこと

成分・分量

100g中

成分	分 量	はたらき
ヘパリン類似物質	0.3 g	血行促進作用、抗炎症作用、水分保持作用がある

添加物として、カルボキシビニルポリマー、トリイソプロパノールアミン、プロピレングリコール、イソプロパノール、香料を含有する

(保管および取扱い上の注意)

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること
- (2)小児の手の届かないところに保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)



製品のお問い合わせ先 お客様相談室 ☎ 06(6203)3625 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く) ホームページアドレス http://pr.kobayashi.co.jp 製造販売元 **小林製薬株式会社** 〒567-0057大阪府茨木市豊川1:30-3