

タムシチンキ



- 使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。第2類医薬品
また必要なときに読めるよう大切に保管してください。
- 使用期限(パッケージ底面および容器底面に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

小林タムシチンキ^b 水虫・たむし用薬

みずむし・たむし(いんきんたむし、ぜにたむし)は真菌の一種の白せん菌が皮膚に寄生して生じる治りにくい皮膚病です。

小林タムシチンキ^bはこの真菌を殺すミコナゾール硝酸塩を主成分とし、角質を軟化させるサリチル酸、二次感染の予防にイソプロピルメチルフェノールを効果的に配合した水虫・たむし治療薬です。

販売名：小林タムシチンキ^b

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと

- (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣など)、陰のう、外陰部など
- (2) 湿疹 (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



相談すること

1 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人 (2) 乳幼児 (3) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 患部が顔面または広範囲の人
- (6) 患部が化膿している人 (7) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人(陰のうにかゆみ、ただれなどの症状がある場合は、湿疹などの他の原因による場合が多い)

2 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、落屑、ただれ、乾燥・つっぱり感、水疱

- (2) 2週間位使用しても症状がよくなりえない場合、または症状の悪化が見られた場合

効能・効果 みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

用法・用量 1日数回患部に適量を塗布してください

＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと (2) 目に入らないように注意すること 万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (4) 外用にのみ使用すること

成分・分量 100ml中

ミコナゾール硝酸塩…………… 1g
サリチル酸…………… 4g
イソプロピルメチルフェノール…………… 0.3g
クロルフェニラミンマレイン酸塩…………… 0.2g
リドカイン…………… 2g
dL-カンフル…………… 1.5g


添加物として、エタノールを含有する

保管および取扱い上の注意


(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること (2) 小児の手の届かないところに保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと (誤用の原因になったり品質が変わる)
(4) 火気に近づけないこと (エタノール含有物) (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用すること

●本剤は合成樹脂などを軟化したり、塗料を溶かすことがあるため、家具や床などにつかないようにすること


塗布具の使用法



① キャップをはずして、



② キャップの内側のネジに塗布具をねじ込んでください。



③ 使用後は塗布具を付けたままキャップをしっかりと締めてください。



発売元
小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-3-6

— 製品のお問い合わせ先 —
お客様相談室 ☎ 06(6203)3625
受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)
ホームページアドレス <http://pr.kobayashi.co.jp>

製造販売元
小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3
MADE IN JAPAN

10086411