

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人は使用しないこと。

相談すること ① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 口内のひどいただれのある人。(3) 甲状腺機能障害の診断を受けた人。② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

③ 5～6日間使用しても症状がよくなる場合合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

成分・分量 1mL中

ポビドンヨード 70mg (有効ヨウ素として 7mg)
● 添加物として、エタノール、l-メントール、サッカリンNa、香料を含有します。

【成分・分量に関連する注意】 本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがある。

効能・効果

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法・用量

1回、本剤 2～4mL を水 約 60mL にうすめて、1日数回うがいしてください。

【用法・用量に関連する注意】 (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2) 本剤はうがい用だけに使用し、キズややけどへの使用や、内服はしないこと。 (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(4) 本剤は使用する時にうすめて、早めに使用すること。(5) 定められた用法、用量を厳守すること。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)(4) 衣服等に付着すると着色するので注意すること。なお、付着した場合にはすぐに水でよく洗い落とすこと。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

発売元


株式会社 明治 136-8908 東京都江東区新砂1-2-10

製造販売元

健栄製薬株式会社 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

製品情報問合せ先: **くすり相談室** 0120-841-704
東京都中央区京橋2-4-16(Meiji Seika ファルマ(株))
9時～17時(土、日、祝日を除く)

計量カップの使い方



正しい濃度にうすめたうがい液
約60mLを3度に分けてうがいます

1度目のうがい

食べかすや、口の中の有機物を取るため口に含み比較的強くうがいます



2度目のうがい

上を向いて、のどの奥までうがい液が届くように15秒程度うがいます



3度目のうがい

2度目と同様、うがい液が口の中からのどに十分に届くように15秒程度うがいます

