

エキセドリンカプセル

11 珍 11

- さい

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のたるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

効能

(1) 頭痛・肩こり痛・腰痛・月経痛(生理痛)・歯痛・抜歯後の疼痛・筋肉痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・外傷痛の鎮痛(2) 悪寒・発熱時の解熱

用法・用量

なるべく空腹時をさせて服用してください。服用間隔は6時間以上おいてください。

年 齢	成人(15歳以上)	15歳未満
1回量	2カプセル	服用しないこと
1日服用回数	2回を限度とする	

<用法・用量に関連する注意>

(1) カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



(2) 用法・用量を厳守してください。

成分(2カプセル中)

有効成分	含 量	はたらき
アセチルサリチル酸	500mg	熱を下げ痛みをおさえます。
アセトアミノフェン	300mg	
無水カフェイン	120mg	痛みをおさえる働きを助け、頭痛をやわらげます。

※添加物としてトウモロコシデンプン、ジメチルポリシロキサン、ラウリル硫酸Na、青色1号、酸化チタン、ゼラチンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

■お問い合わせ先

ライオン株式会社 お客様相談室 ☎03-3621-6100 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

■ホームページアドレス www.bufferin.net/ 製品についての詳しい情報は、ホームページでもご覧いただけます。

ライオン株式会社 〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7