



sato

セルフメディケーションをサポートします
HEALTHCARE INNOVATION

第2類
医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



婦人薬

神 恵

四物湯エキス・ビタミンE誘導体配合

神恵は…

- 当帰・芍薬・川芎・地黄・猪苓の5つの生薬を組み合わせた四物湯（しもつとう）を配合し、めまい、のぼせ、耳鳴などの更年期の諸症状に効果をあらわします。
- 末梢血管を拡張するコハク酸トコフェロールカルシウム（ビタミンEコハク酸エステルカルシウム）とイノシトールヘキサニコチネートが血行を促進し、末梢血管障害、四肢冷感症、冷え症に効果をあらわします。
- 神経を円滑に働かせるシアノコバラミンを配合し、肩こり、腰痛に効果をあらわします。




使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心、胃部不快感、食欲不振、腹痛

- (2) しばらく服用しても症状がよくなる場合
3. 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師又は薬剤師にご相談ください
4. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください
便秘、下痢

〔効 能〕

末梢血管障害、四肢冷感症、冷え症、しもやけ、しびれ感、月経困難症、動脈硬化による循環障害、肢端チアノーゼ、レイノー氏病

めまい・のぼせ・頭重・耳鳴・動悸・動脈硬化・全身倦怠・肩こり・腰痛・不眠等の更年期諸症状

〔用法・用量〕

通常下記の1回服用量を1日2～3回服用します。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人（15才以上）	1錠	2～3回
15才未満	服用しないでください	

〔用法・用量に関連する注意〕

定められた用法・用量を厳守してください。

〔成分・分量と働き〕

成 分	分 量	働 き
イノシトール ヘキサニコチネート	120mg	末梢の血管を拡張する働きがあり、四肢冷感症、しもやけなどに効果をあらわします。
コハク酸 トコフェロールカルシウム （ビタミンコハク酸エステルカルシウム）	105mg	末梢の血行を改善し、末梢血管障害、四肢冷感症、肩こりなどに効果をあらわします。
四物湯エキス	96mg	血行を促進し、体を温める働きがあり、めまい、のぼせ、頭重などの更年期の諸症状に効果をあらわします。
シアノコバラミン （ビタミンB ₁₂ ）	0.03mg	神経細胞の機能を維持して神経を円滑に働かせることで、肩こり、腰痛に効果をあらわします。
カンゾウエキス	30mg	甘草から抽出したエキスでグリチルリチン酸などを含みます。

添加物として、トウモロコシデンプン、バレイショデンプン、乳糖、CMC-Ca、ケイ酸Al、ヒドロキシプロピルスターチ、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、タルク、セラック、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、アラビアゴム、炭酸Ca、ゼラチン、酸化チタン、白糖、カルナウバロウ、赤色3号、黄色5号を含有します。

●神恵に配合の四物湯エキスは……

四物湯エキスは五つの生薬（当帰、芍薬、川芎、地黄、猪苓）を組み合わせたエキスです。



当帰



芍薬



川芎




地黄



猪苓

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお問い合わせ申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03 (5412) 7393
受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号