

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第②類医薬品

エバシェリン® 75g

EVERSCHELLIN

エバシェリンは生薬ハーブの作用で
自然な便通を促すよう工夫された植物性の便秘治療剤です。

⚠使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
3. 大量に服用しないこと。



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、悪心・嘔吐
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

- (2) 1週間位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
下痢

効 能

便秘。便秘に伴う次の症状の緩和：



頭重



のぼせ



肌あれ、吹出物



食欲不振
(食欲減退)



腹部膨満、
腸内異常はっ酵



痔

(裏面へつづく)

用法・用量

いずれも1日2回を限度とし、下記の量をなるべく空腹時に服用してください。

年 齢	1回服用量
成人（15歳以上）	0.5～0.75g
11歳以上15歳未満	0.25～0.5g
7歳以上11歳未満	0.1875～0.375g
7歳未満	服用しないでください

服用間隔は4時間以上おいてください。

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

★添付のスプーン一杯は約0.75g 計量線2/3は約0.5g 1/2は約0.375gです。

<用法・用量に関連する注意>

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

服用のしかた

コップ一杯（約180ml）の水で、服用してください。一般的に便秘薬の有効量は、人により個人差がありますので自分にあった服用量を見つけることが大切です。年齢・体重に応じて、服用量を加減してください。特に高齢者の方・病弱の方等、初回は最小量から服用してください。添付の計量スプーンをご使用下さい。



スプーン

- ・1杯は約0.75g
- ・計量線 $\frac{2}{3}$ は約0.5g
- ・計量線 $\frac{1}{2}$ は約0.375g

成分・分量と働き (1.5g)中

成 分	分 量	働 き
センナ実	1.125g	センナの作用する大腸まで達し、腸内細菌の作用で瀉下作用をあらわします。
センナ	0.375g	

<成分に関連する注意>

本品は天然物（生薬）を用いていますので、粉末の色が多少異なることがあります。

<保管及び取扱い上の注意>

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。開封後は冷蔵庫に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- (4) 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

品質保持には万全の注意をはらっておりますが、本品は植物性の生薬の為、開封後は保管が悪いとカビたり、虫がついたりする恐れがあります。

便秘解消のポイント

1. 1日1回の排便習慣を身につけましょう。
2. 食生活の改善を心がけましょう。
3. 適度な運動を心がけましょう。



エバシェリンに関するお問い合わせ、服用相談は薬王製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0744-33-8855 受付時間9:00～17:00（土、日、祝日を除く）にお願い致します。

※携帯に便利なエバシェリン分包（20包入、48包入）もございます。

製造販売元 薬王 薬王製薬株式会社

奈良県磯城郡田原本町245

発 売 元 株式会社エバース・ジャパン

横浜市港北区新横浜2-14-26

開封日 年 月 日