



# sato

## セルフメディケーションをサポートします HEALTHCARE INNOVATION

\*：2009年10月に改訂しました。

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

### 第2類医薬品

防風通聖散エキス製剤

## ココスリム

腹部に皮下脂肪が多く、  
便秘がちな方に

### ココスリムは…

- お腹周りの脂肪が気になる方、便秘がちな方の肥満症、高血圧や肥満に伴う、むくみ・便秘などの諸症に効果をあらわします。
- 18種類の生薬からなる防風通聖散エキスを配合しています。



### 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。  
(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。  
(5) 発汗傾向の著しい人。  
(6) 高齢者。  
(7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。  
(8) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難  
(9) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください  
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合



| 関係部位  | 症 状                  |
|-------|----------------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ            |
| 消 化 器 | 胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称     | 症 状                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 間質性肺炎     | せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。                           |
| 偽アルドステロン症 | 尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。 |
| 肝機能障害     | 全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。                      |

(2) 1ヵ月位（便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなりません場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師にご相談ください

4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください  
下痢

#### \*〔効 能〕

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：  
高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症（副鼻腔炎）、湿疹・皮膚炎、ふきでももの（にきび）、肥満症

#### \*〔用法・用量〕

下記の1回服用量を1日3回食前又は食間に、水又は白湯で服用してください。

| 年 齢       | 1回服用量       | 1日服用回数 |
|-----------|-------------|--------|
| 成人(15歳以上) | 4錠          | 3回     |
| 15歳未満7歳以上 | 3錠          |        |
| 7歳未満5歳以上  | 2錠          |        |
| 5歳未満      | 服用しないでください。 |        |

#### \*〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 5歳以上15歳未満に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

#### 〔成分・分量〕1日量（12錠）中

|                |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| トウキ……………0.6g   | シヨウキョウ……………0.2g      | ビャクジュツ……………1.0g |
| シャクヤク……………0.6g | ケイガイ……………0.6g        | キキョウ……………1.0g   |
| センキュウ……………0.6g | ポウフウ……………0.6g        | オウゴン……………1.0g   |
| サンシシ……………0.6g  | マオウ……………0.6g         | カンゾウ……………1.0g   |
| レンギョウ……………0.6g | ダイオウ……………0.75g       | セッコウ……………1.0g   |
| ハッカ……………0.6g   | 乾燥硫酸ナトリウム……………0.375g | カッセキ……………1.5g   |

上記生薬より得た防風通聖散エキス粉末2,750mgを含みます。

添加物として、ステアリン酸Mg、CMC-Ca、二酸化ケイ素を含有します。

#### ◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口

電話 03(5412)7393

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

発売元

佐藤製薬株式会社

東京都港区元赤坂1丁目5番27号

製造販売元

大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574