

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

鎮 痒 消 炎 外 皮 剤
虫さされ、肩こりに…

第2類医薬品

KINKAN

キンカン®

■ 特 長 ■

『キンカン』の有効成分は、すばやく皮ふへ浸透し、局所の熱を奪い去るとともに、皮ふ刺激、局所マヒ、血行改善作用等を發揮し、虫さされ、かゆみ、肩こり、腰痛、打撲、捻挫に対して、優れた効果を發揮します。

⚠ ■ 使用上の注意 ■

❌ **してはいけないこと**〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。〕

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1)くちびる等の粘膜部や、目のまわり
 - (2)傷、ただれ、かぶれのある所
2. ガーゼや脱脂綿に浸して患部に貼りつけないでください。



相談すること

1. 次の方は使用前に医師または薬剤師にご相談ください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3)今までに薬などによりアレルギー症状（例えば発疹、発赤、かゆみ、かぶれ、ただれ等）を起こしたことがある人
 - (4)湿潤やただれのひどい人
 - (5)皮ふの特に弱い人や7歳以下の人
 - (6)顔や頭皮に使用する人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1)使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹、発赤、かゆみ、かぶれ、ただれ、灼熱感

- (2)5～6回使用しても症状がよくなる場合

■ 効能または効果 ■

虫さされ、かゆみ、肩こり、腰痛、打撲、捻挫

(裏面もお読みください)

■ 用法及び用量 ■

1 日数回、患部に適量を塗布してください。

・塗布部を患部に軽く押しつけ、液を出してから塗ってください。

(1)15歳未満のお子様を使用する場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合は、直ちに水又はぬるま湯で洗い、眼科医の診察を受けてください。

(3)外用のみに使用してください。

誤って口に入った時は、水でうがいをするか、水（または牛乳）を飲ませてください。なお症状によっては、この説明文書を持って医師にご相談ください。

◎キンカンは、「乾かしては塗り、乾かしては塗ってください。」これを1日に5～6回くり返してください。

■ 成分及び分量 ■ 本品100mL中

アンモニア水	21.30mL	サリチル酸	0.57g
l-メントール	1.97g	トウガラシチンキ	0.35mL
d-カンフル	2.41g		(原生薬量として35mg)

添加物として朝鮮人参抽出液、溶剤としてアルコール含有

■ 保管及び取扱上の注意 ■

(1)直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して保管してください。

(2)小児の手のとどかない所に保管してください。

特に1～2歳のお子様は、わずかなすきにビンを手にとり、口にもってゆく恐れがありますから、保管の場所はもとより、使用中もビンの小児の手のとどく所に置かないようにご注意ください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)

(4)溶剤としてアルコールを含んでいるため下記事項に充分注意してください。

●暖房器具(ファンヒーターなど)の付近など、火気に近づけると、破裂、引火などの危険があります。

●家具、床その他塗装箇所に液がつきますと、変色することがあります。

●車の中は、直ぐに高温になりやすいので、放置しないでください。

(5)使用期限(外箱底面及びラベルに記載)を過ぎた製品は使用しないでください。キャップを一度開けた後は、品質保持の点から、できるだけ早めに使用してください。

(6)塗布部分が汚れた時は、ふき取ってください。

■ 包装 ■ 15mL、55mL、120mL

■ お客様相談窓口 ■ 本品についてのお問い合わせは、

●お買い求めのお店 ●または下記までお願いします。

株式会社 金冠堂 お客様相談室 電話 03-3421-6171

[電話受付時間：月～金(祝・祭日を除く) 9:00～16:00]

「副作用被害救済制度の問合わせ先」の記載は、この制度が医薬品医療機器総合機構により運営している事を紹介し、認知して頂く為に表記しています。

詳しい内容については、直接「問合わせ先」にお尋ねください。

製造販売元 株式会社 金冠堂

〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1-34-14

<http://www.kinkan.co.jp>