



服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

「モリ」ちくのう錠

特 徴

「モリ」ちくのう錠は、辛夷、桔梗など成分欄記載の 16 種類の生薬で構成される和漢薬の、のみやすいエキスイ糖衣錠です。本剤の服用で鼻づまりなどの不快な症状が改善され、ちくのう症、鼻カタルなど効能欄記載の鼻の病気に効きめがあります。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸虚弱で冷え性の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
- (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
むくみ
- (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感、食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、 まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧 が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

効能又は効果

蓄膿症、副鼻腔炎、鼻カタル、鼻閉塞、臭鼻症

用法及び用量

次の量を朝夕空腹時に、水またはお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（16 歳以上）	3～6 錠	2 回
15 歳以下 8 歳以上	2～3 錠	

<用法及び用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分及び分量

本剤 6 錠 (2.4 g) 中、下記生薬の水製乾燥エキス 1.2 g が含まれています。

キキョウ（桔梗）……………2 g	ソウジュツ（蒼朮）……………0.1 g
カンソウ（甘草）……………1.5 g	サンシシ（山梔子）……………0.1 g
シャクヤク（芍薬）……………1.5 g	サイコ（柴胡）……………0.1 g
タイソウ（大棗）……………1.5 g	ショウマ（升麻）……………0.1 g
キジツ（枳実）……………1 g	チモ（知母）……………0.1 g
ショウキョウ（生姜）……………1 g	バクモンドウ（麦門冬）……………0.1 g
セッコウ（石膏）……………1 g	シンイ（辛夷）……………1 g
オウゴン（黄芩）……………0.1 g	ビフヨウ（枇杷葉）……………0.1 g

添加物として、白糖、タルク、アラビアゴム、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、カルナウバロウ、黄色4号（タートラジン）を含有しています。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）

本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 お客様相談室
〒545-0002 大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2
電話（06）6629-0062
受付時間 10時から17時まで（土、日、祝日を除く）

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2