

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

皮ふ疾患治療剤

太 乙 膏[®]
たい おつ こう[®]

(軟 膏)

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
飲んだり、眼科用として使用しないでください。



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 今までに、薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2) 患部が広範囲の人
(3) 湿潤やただれのひどい人
(4) 深い傷やひどいやけどの人
(5) 医師の治療を受けている人
- 次の場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等

- (2) 数日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

湿疹(くさ)、火傷(やけど)、とびひ、ひび、あかぎれ、ただれ、きりきず、擦過傷(すりきず)、靴ずれ、かみそりまけ、凍傷

用法・用量

1日2～3回患部に適量をすりこむか、又はガーゼにのばして貼ります。

用法・用量に関する注意

- (1) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合は眼科医の診察を受けてください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 定められた用法・用量を守ってください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

裏面もお読みください

有効成分・分量(100 g 中)

成 分	含 有	はたらき
酸化亜鉛	10.0 g	皮ふのたんぱく質と結合して被膜をつくるので、消炎作用、緩やかな防腐作用があります。また、浸出液の吸収及び分泌抑制により、創面などを乾燥させます。
ホモスルファミン	0.5 g	れんさ球菌、ブドウ球菌などの化膿性球菌及び肺炎菌などに強い抗菌作用があります。
dl-カンフル	0.5 g	局所刺激作用、局所麻酔作用、鎮痛作用があり、これらの作用により皮ふの引赤・刺激、血行改善、消炎、鎮痛及び鎮痒作用を現します。

添加物として、白色ワセリン、モクロウ、オリブ油を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (2) 直射日光の当たらない、なるべく涼しい所にフタをして横にならないように保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わります)。

＜お問い合わせ先＞

(1) 購入した薬局・薬店

(2) 協和新薬株式会社

住所：埼玉県草加市小山 1 - 28 - 8

電話：048-942-1445

〔受付時間：9時～17時まで(土・日・祝日を除く)〕

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

＜製造販売元＞ 協和新薬株式会社
埼玉県草加市小山 1 - 28 - 8