

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

外用化膿性皮膚疾患用薬

第2類医薬品

吸出し青膏

(一名たこの吸出し)

吸出し青膏は有効成分中に含まれている硫酸銅の腐蝕作用とサリチル酸の角質軟化作用により、はれものの口を開き、膿を排泄して患部を治します。

【使用上の注意】



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目や目の周囲、粘膜等（口腔・鼻腔など）
- (2) 湿疹
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のある患部
- (4) 出血のある患部



相談すること

①次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 乳幼児
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (4) 今までに薬や化粧品により、アレルギー症状（例えば発疹、発赤、かゆみ、かぶれ、発熱など）を起こしたことのある人
- (5) 患部が顔面又は広範囲の人

②次の場合は直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等

- (2) 2週間位使用しても症状の改善がみられない場合

●効能

化膿性皮膚疾患、よう、ちょう等のはれものの吸い出し。

●用法・用量

ご使用のときは、**かならず、ここに指定しております用法用量を、お守りください。**

- (1) 患部を清潔にしてください。
- (2) 添付のへうにてガーゼ又はリント布に膏薬適量を広げずに塗ってください。
尚冬季軟膏のかたいときは暖めてからお使いください。
- (3) 軟膏の用意ができましたら、それを患部の中心につけ、その上に油紙等をのせ、ずれないように絆創膏でとめ、必要があれば包帯をしてください。
- (4) はりおわりましたら膿が出るまでは1日に2回はりかえてください。

- (5)膿の根の深い時、又は皮膚面の厚いときは普通より多くはりかえてください。
- (6)膿が出はじめ、ことに排膿の多いときは回数多くはりかえ、膿が完全に出切るまで続けて、すっかり膿が出切りましたら、使用を中止し殺菌ガーゼ等で傷口を保護してください。

〈注意〉

- (1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (2)小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)乳幼児又は皮膚の特に弱い方、いろいろなものにかぶれやすい方の場合は、腕の内側などの柔らかいところに少量塗って翌日異常のないことを確かめてから使用してください。
- (4)外用にのみ使用してください。
- (5)局所刺激作用がありますので、本剤が患部の周りの皮膚につかないよう、よく注意して使用してください。
- (6)回復後、瘢痕が残る事があります。

●成分・分量（100g中）


植 物 油	35.09g	ペルーバルサム	0.5g
松 脂	31.5g	酢 酸	0.31g
木 蠟	25.0g	サ リ チ ル 酸	0.2g
パラフィン	2.7g	着色剤（ギネアグリーンB）	微量
白色ワセリン	2.6g		
硫 酸 銅	2.0g		

●保管および取扱上の注意

- (1)小児の手のとどかないところに保管してください。
- (2)使用後は必ずふたをして、直射日光をさけ、涼しいところに保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4)外用薬ですから間違えて口に入らないように注意してください。
- (5)本剤が衣服等に付着した場合、色素が落ちにくくなることがありますのでご注意ください。

●治療のポイント

本剤は刺激作用がありますので患部の中心につけ、周りの皮膚につかないよう留意してください。



本品についてのお問い合わせはお買い求めのお店又は下記にお願い致します。

町田製薬株式会社 お客様相談室
電話 (03) 3466-2441 (大代表)
受付時間 平日 9:00~17:00

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
フリーダイヤル ☎ 0120-149-931

製造販売元 町田製薬株式会社

東京都渋谷区笹塚1-35-1

電話 (03) 3466-2441 (大代表)