

胃健錠



使用上の注意



してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります]

1. 次の人は服用しないでください。

透析療法を受けている人

2. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 次の診断を受けた人

腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談してください。

2週間位服用しても症状が良くならない場合

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ（胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき）、嘔吐、飲みすぎ、胃痛、食欲不振、食べ過ぎ

用法・用量

次の量を食後30分を目安に、水またはお湯と一緒にかまずに服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人（15 歳 以上）	2 錠	3 回
11 歳 以上 15 歳 未 満	1 錠	
11 歳 未 満	服用しないこと	

成分・分量 6錠（大人1日量）中

成 分	含 量	は た ら き
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	300mg	胃内の酸度を安定させ、胃の粘膜に被膜をつくります。
合成ケイ酸アルミニウム	300mg	制酸作用に持続性があり、胃粘膜の保護作用があります。
沈降炭酸カルシウム	300mg	緩慢な制酸作用と吸着作用があります。
炭酸水素ナトリウム	1,950mg	過剰な胃酸をすばやく中和します。
センプリ末	30mg	胃部不快感・食欲不振など慢性的に衰えた胃腸機能の回復のための苦味健胃生薬です。
ゲンチアナ末	30mg	

添加物：カルメロース Ca、タルク、ステアリン酸

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。