

*2011年11月改訂
(記載要領変更に伴う改訂)

第2類医薬品

御使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように大切に保管して下さい。

生薬製剤

こう あつ がん 降 圧 丸

ハッ目製薬株式会社

本剤は、動物性生薬の羚羊角（サイガカモシカの角）のほか、有効成分として10種類の生薬を配合し、高血圧に伴う頭痛・どうき・手足のしびれ・肩のこり・のぼせ・めまい・いらいらに効果があります。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけて下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- (5) 体が冷える傾向の人
- (6) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (7) 薬によりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人
- (8) 次の症状のある人
下痢、高熱
- (9) 次の医薬品を服用している人
瀉下薬（下剤）

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	ぜんそく

*まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

軟便、下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【効能・効果】

高血圧に伴う頭痛・どうき・手足のしびれ・肩のこり・のぼせ・めまい・いらいら

【用法・用量】

次の量を1日2回朝と晩に水又は白湯で服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
大 人 (15歳以上)	10丸	2回
15歳未満	服用しないこと	

【成分】

大人（15歳以上）1日の服用量20丸中、次の成分を含んでいます。

成 分	含有量	成 分	含有量
レイヨウカク	0.03g	コ ハ ク	0.15g
ト ウ キ	0.30g	ジ ン コ ウ	0.40g
オ ウ レ ン	0.40g	セ ン キ ュ ウ	0.20g
テ ン マ	0.20g	ア キ ョ ウ	0.33g
ジ オ ウ	0.15g	カンゾウエキス	0.33g
ダ イ オ ウ	0.15g		

添加物として、ハチミツ、白糖、カッセキ、黄色4号(タートラジン)、赤色2号を含有します。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物(生薬)を用いていますので、丸薬の色や味が多少異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 本剤は湿気などの影響により薬が変質することがあるので、次のことに注意して下さい。
 - 1) 服用のつどフタをよく締めること。
 - 2) 直接手に薬剤をとらないこと。(キャップなどにとり分ける。)
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

ハッ目製薬株式会社 (お客様相談室)

電 話 (03) 3680-0005

受付時間 9:00～17:00 (土・日、祝日を除く)

製造販売元

ハッ目製薬株式会社

東京都江戸川区船堀2-14-14 (〒134-0091)