

Hisamitsu

肩こり・眼精疲労

新サロパス®
BE内服液Oxoamidin Powder
Tocopherol Acetate
Benfotiamine
Riboflavin Sodium Phosphate
Pyridoxine Hydrochloride
Nicotinamide

第3類医薬品

50mL

【使用上の注意】 相殺すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、本品を持って
医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

異常徴候	症状
消化器	悪心・嘔吐

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合。

2. 次の症状があらわれたことがあっても、このような
症状の継続又は増強が見られた場合には、服用
を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。/
軟便、下痢。【効能・効果】 ●次の諸症状の緩和・神経痛、筋肉痛、関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、
肩凝り、頭痛等。ただし、これらの症状について、1ヵ月
ほど服用しても改善がみられない場合は、医師又は薬
剤師にご相談してください。 ●次の場合のビタミンB₁₂の
補給（肉体的労作、妊娠、授乳中、術中術後の体力低下時）【用法・用量】 成人（15歳以上）1回1瓶（50mL）を
1日2回服用してください。服用間隔は4時間以上お
いてください。【成分・分量】 1日量100mL（2瓶）中
オキソアミジン末（加工ニコチン末）50mg、酢酸
α-トコフェロール（ビタミンE）100mg、ベンゾチアミン（ビタミンB₁）
100mg、リボフラビン（ビタミンB₂）50mg、ニコチン酸アミド60mg、
トコチネル（ビタミンB₆）50mg、ニコチン酸アミド60mg、
添加物として、安息香酸Na、エタノール、エタール（エリン）、果糖ブドウ糖液糖、ク
エン酸、クエン酸Na、グリセリン、グリタミン酸Na、香料、ポリオキシエチレン硬
化、ポリリン酸、pH調整剤、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬
化、ポリリン酸を含有しています。 ●本品に配合されているビタミンB₁₂により、尿が
黄色くなることがあります。【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管し
てください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 使用期限を
過ぎた製品は服用しないでください。販売元 ●久光製薬株式会社 〒841-0017 鳥栖市田代大宮町408
久光製薬お客様相談室：〒100-6221 東京都千代田区丸の内1-11-1 ☎ 0120-133250
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:50（土、祝日を除く）副作用等報告徴収制度
☎ 0120-149-931

使用期限

製造販売元

久光製薬株式会社

〒838-3542

富山県富山市水橋町277番10

ガラス：珪 金属：キャップ 02 7908HT

