

アンメルシン1%ヨコヨコ



保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光を避け、キャップをしっかりと閉めて涼しいところ(冷暗所)に立てて保管すること
 - (2) 小児の手の届かないところに保管すること
 - (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり、品質が変わる)
 - (4) 火気に近づけないこと(エタノール含有物)
- キャップをしっかりと閉めないとき液が漏れることがあります
 - 本剤は合成樹脂などを軟化したり、塗料を溶かすことがあるため、プラスチック製品(眼鏡わく、くし、便座など)、衣類、塗料塗り家具、床、皮革などにつかないようにすること
 - 衣類に付着した場合には、各衣類の洗濯表示に従って、すみやかに洗うこと

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面および容器底面に記載)を
過ぎた製品は使用しないこと

販売名：アンメルシン1%ヨコヨコ

(External Anti Inflammatory/
Analgesic Containing Indometacin)

外用消炎鎮痛剤

特徴

1. ひざ・腰の痛みに優れた効き目を発揮する塗り薬です
2. 有効成分インドメタシンが、皮ふから浸透し関節の痛みを和らげます
3. 患部に直接塗れるボトルタイプなので、手を汚さず手軽に使えます

使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1 次の人には使用しないこと

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人

2 次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜など
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口
- (3) みずむし・たむしなど、または化膿している患部

3 長期連用しないこと



相談すること

1 次の人には使用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
- (3) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2 次の場合は、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師または薬剤師に相談すること

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなりません

成分・分量(100mL中)

インドメタシン 1,000mg
トメントール 3,000mg

添加物として、グリチルレチン酸、ベンジルアルコール、ラウロマクロゴール、炭酸プロピレン、pH調整剤、BHT、ハアセチルショ糖、エタノールを含有する

効能・効果

関節痛、腰痛、打撲、捻挫、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、肩こりに伴う肩の痛み

用法・用量

1日4回を限度として患部に適量塗布する

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 1才以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
 - (2) 1才未満の小児に使用させないこと
 - (3) 目に入らないよう注意すること
万一目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと
なお症状が重い場合には、直ちに眼科医の診療を受けること
 - (4) 外用にのみ使用すること
 - (5) 1週間あたり50mLを超えて使用しないこと
- 塗擦部位をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないこと
 - 皮ふの特に弱い方は、同じところに続けて塗布しないこと
 - 同じ部位に他の外用剤を併用しないこと



副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

ラベル
ボトル
キャップ



発売元

小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-3-6

—— 製品のお問い合わせ先 ——

お客様相談室 ☎ 06(6203)3625

受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

ホームページアドレス <http://pr.kobayashi.co.jp>

製造販売元

小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN