



外用消炎鎮痛剤

肩こり・筋肉痛に

アンメルツヨコヨコ



肩こり・筋肉痛 アンメルツ ヨコヨコ

■保管および取扱い上の注意■

- (1) 直射日光を避け、キャップをしっかりと閉めて涼しいところ(冷暗所)に立てて保管すること
- (2) 小児の手のとどかないところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり、品質が変わる)
- (4) 火気に近づけないこと(エタノール含有物)

※キャップをしっかりと閉めないとき液が漏れることがあります

※プラスチック製品(眼鏡わく、くし、便座など)、化繊の衣類、木材(塗料塗り家具、床など)、皮革などに液がつくと損耗したり、シミになることがあるので注意すること

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

第3類医薬品 82mL

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面および容器底面に記載)を
過ぎた製品は使用しないこと

販売名: アンメルツヨコヨコ
(External Anti Inflammatory / Analgesic)

第3類医薬品

外用消炎鎮痛剤

特 徴

1. とても塗りやすいタイプです
アンメルツヨコヨコは、容器の首の部分が曲がっているため、塗りにくい背中や腰の患部にでも、薬液がにじみ出るラバーキャップがピッタリと接し、スムーズに塗布することができます
2. どこでもむらなく適量を塗布できます
ラバーキャップより適量の薬液がにじみ出ますので、どの患部にでも必要なだけ、適量を塗布できます
3. 塗りごこちのよいさわやかな薬剤です

★塗布したあと、入浴や運動などをしますと、強い刺激(ヒリヒリするなど)を感じる場合があります
これは、アンメルツヨコヨコの有効成分が患部に作用しているためです 刺激が強すぎる時は、石鹸で洗い流すと刺激は緩和します

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

❶ 次の部位には使用しないこと

(1) 目の周囲、粘膜など (2) 湿疹、かぶれ、傷口



相談すること

❶ 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

❷ 次の場合は、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師または薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

■成分・分量(100mL中)■

サリチル酸メチル	5,000mg
l-メントール	5,200mg
dl-カンフル	5,200mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	100mg
チモール	700mg
ノナン酸バニリルアミド	10mg

添加物として、プロピレングリコール、エタノール、フェニルエチルアルコールを含有する

■効能・効果■

肩のこり、筋肉痛、神経痛、腰痛、打撲、筋肉のはれ、リウマチ、しもやけ

■用法・用量■

患部に適量を塗布してください

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (2) 目に入らないよう注意すること
万一目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと
なお症状が重い場合には、直ちに眼科医の診療を受けること
- (3) 外用にのみ使用すること
- (4) 塗擦部位をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないこと
- (5) 皮ふの特に弱い方は、同じところに続けて塗布しないこと



発売元
小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-3-6

—— 製品のお問い合わせ先 ——

お客様相談室 ☎06(6203)3625

受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

ホームページアドレス <http://pr.kobayashi.co.jp>

製造販売元

小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN