

- 服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるように大切に保管してください
- 使用期限(パッケージ側面およびシラベルに記載)を
過ぎた製品は服用しないこと

開封日

月

日

関節痛、腰痛に アンメルシン コンドロパワー錠

関節を形成する骨の表面は軟骨で覆われており、軟骨には骨と骨のつなぎ目の衝撃を吸収する働きがあります。つらい関節痛はこの軟骨が不足する事が原因の一つだと言われています。アンメルシンコンドロパワー錠に配合されている「コンドロイチン硫酸エステルナトリウム」には、軟骨成分の生成を促すなどの働きがあるので、関節を正常な状態に保ち、つらい関節痛などの症状を緩和します。

販売名：アンメルシン コンドロパワー錠

ビタミンB₁主薬製剤

第3類医薬品

- 特徴
- 1.軟骨成分「コンドロイチン硫酸エステルナトリウム」を900mg(1日量:6錠中) 配合
 - 2.関節痛・神経痛などの症状を緩和するビタミンB₁誘導体(フルスルチアミン塩酸塩)を配合
 - 3.ビタミンの吸収を速めるニンニクエキス配合



使用上の注意



相談すること

- 1.次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること
 - (1) 本人または家族がアレルギー体質の人
 - (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、悪心・嘔吐、胃部不快感、口内炎

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
- 3.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること
軟便、下痢

効能・効果

- ・次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛、関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、眼精疲労、便秘
 - ・脚気
- 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師に相談してください」
- ・次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	3錠	朝夕2回
11才以上15才未満	2錠	
7才以上11才未満	1錠	
7才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
- (2) 用法・用量を厳守すること

成分・分量 1日量：6錠中

成 分	分量	はたらき
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	900mg	軟骨成分の生成を促す作用などがあり、関節を正常な状態に保つ
フルスルチアミン塩酸塩（ビタミンB ₁ 誘導体）	20mg	関節痛、神経痛などの症状緩和
ニンニクエキス	30mg	ビタミンB ₁ の作用を助ける

添加物として、カルメロースCa、ポビドン、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、乳糖水和物、白糖、マクロゴール、ヒドロキシプロピルセルロース、エチルセルロース、セルロース、タルクを含有する

保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること
2. 小児の手の届かないところに保管すること
3. 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）
4. 本剤をぬれた手で扱わないこと
5. ビンの中の詰め物は輸送時の破損防止用なので開封時に捨てること



発売元

小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

—— 製品のお問い合わせ先 ——
お客様相談室 ☎ 06 (6203) 3625
受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）
ホームページアドレス <http://pr.kobayashi.co.jp>

製造販売元

牛 津 製 薬 株 式 会 社

〒849-0304 佐賀県小城市牛津町下砥川1-2