



外用消炎鎮痛剤

ニオイを気にせず使える肩こり薬

アンメルツ レディーナ

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光を避け、キャップをしっかりと閉めて涼しいところ（冷暗所）に立てて保管すること
- (2) 小児の手のとどかないところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり、品質が変わる）
- (4) 火気に近づけないこと（エタノール含有物）

※キャップをしっかりと閉めない
と液が漏れることがあります
※プラスチック製品（眼鏡わく、くし、
便座など）、化繊の衣類、木材（塗
料塗り家具、床など）、皮革など
に液がつくと損耗したり、シミに
なることがあるので注意すること

発売元
小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-3-6
—— 製品のお問い合わせ先 ——
お客様相談室 ☎ 06(6203)3625
受付時間 9:00~17:00（土・日・祝日を除く）
ホームページアドレス <http://pr.kobayashi.co.jp>

製造販売元
小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

紙：箱 ラベル：ボトル
キャップ

MADE IN JAPAN

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限（パッケージ底面および容器底面に記載）を過ぎ
た製品は使用しないこと

アンメルツレディーナ

販売名：アンメルツ レディーナ **第3類医薬品**
(External Anti Inflammatory / Analgesic) **外用消炎鎮痛剤**

特 徴

- 1 有効成分の働きで、つらい肩こり、
筋肉痛をしっかり和らげます
- 2 オレンジトラスのほのかな香りで、
ニオイを気にせず安心して使えます
- 3 手が汚れず使いやすいヨコヨコボトル

⚠ 使用上の注意

☒ **してはいけないこと**
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

❶ 次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜など
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口

相談すること

- ❶ 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること
(1) 本人または家族がアレルギー体質の人
(2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

- ❷ 次の場合は、直ちに使用を中止し、このパッケージを
持って医師または薬剤師に相談すること
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

★塗布したあと、入浴しますと、強い刺激（ヒリヒリするなど）
を感じる場合があります。これは、アンメルツレディーナ
の有効成分が患部に作用しているためです。刺激が強
すぎる時は、石鹸で洗い流すと刺激は緩和します

効能・効果

肩こり、筋肉痛、筋肉疲労、
腰痛、打撲、捻挫、関節痛

用法・用量

1日数回患部に適量を塗布する

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、
保護者の指導監督のもとに
使用させること
- (2) 目に入らないよう注意する
こと。万一目に入った場合に
は、すぐに水またはぬるま湯
で洗うこと。
なお症状が重い場合には、
直ちに眼科医の診療を受け
ること
- (3) 外用にのみ使用すること
- (4) 塗擦部位をラップフィルム
などの通気性の悪いもので
覆わないこと
- (5) 皮ふの特に弱い方は、同じ
ところに続けて塗布しない
こと

成分・分量（100mL中）

成分	分量	はたらき
サリチル酸 グリコール	2,500mg	炎症を抑え 痛みをやわらげる
トメントール	3,000mg	清涼感を与え、 痛みをやわらげる
クロルフェニラミン マレイン酸塩	100mg	炎症を抑える
トコフェロール 酢酸エステル	100mg	血行を促進する

添加物として、プロピレングリコール、
ジプロピレングリコール、エタノール、
香料を含有する

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931