

筋肉痛・腰痛などで痛みを感じるところ全体に「メンソレータムの **ヲス**ローションA」をすり込み、よくマッサージしてください。

薬効成分がスーッと浸透し患部にジーンと効いて、痛みをとり除いてくれます。

「メンソレータムの **ラス** ローションA」でマッサージ、効き目がわかる乳液タイプの 外用消炎鎮痛剤です。



【こんな症状の方々におすすめします。







■使用上の注意 /

してはいけないこと 💢

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 1.次の部位には使用しないでください。

- (1)目の周囲、粘膜等
- (2)湿疹、かぶれ、傷口

相談すること

- 1.次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください。
 - (1)本人または家族がアレルギー体質の人
 - (2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師または薬剤師に ご相談ください。
 - (1)使用後、次の症状があらわれた場合

F	関係部位	症状
	皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ピリピリ感)、はれ、 かさぶたの様に皮ふがはがれる状態

(2)5~6日間使用しても症状がよくならない場合

→効能

筋肉痛、腰痛、関節痛、肩こり、筋肉疲労、うちみ、ねんざ、打撲、しもやけ

■用法・用量

1日数回、痛みやこりを感じる部分に適量をすり込んでください。

●用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水または ぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受け てください。
- (3) 外用にのみご使用ください。

■成分・分量

サリチル酸メチル ··········12.0% de-メントール ·············· 6.0% 添加物として、トリエタノールアミン、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、 カルボキシビニルポリマー、ラノリン、流動パラフィンを含有する。

母保管及び取り扱いトの注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、 使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くで使用ください。

■容量 65mL

お問い合せ先;お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO □-ト製薬株式会社 大阪市生野区異西 1-8-1

※本品「メンソレータムの **ラブ**ローションA」の他に、クリームタイプの「メンソレータムの **ラブ**」(65g)もございます。