

第3類医薬品

押しあける



ご使用に際して
この説明文書を
必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう
大切に保管して下さい。

微香性 外用消炎鎮痛プラスター 貼り薬 トクホンE

△使用上の注意

■してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと
1) 目の周囲、粘膜等 2) 湿疹、かぶれ、傷口

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
1) 本人又は家族がアレルギー体質の人
2) 薬によりアレルギー症状をおこしたことがある人
2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この説明文書をもって
医師又は薬剤師に相談すること
1) 使用后、皮ふに発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合
2) 5～6日間使用しても症状の改善が認められない場合



■効能又は効果

肩こり、腰痛、筋肉疲労、関節痛、打撲、捻挫、骨折痛、しもやけ

■用法及び用量

薬剤面をおおったライナーを除去し、1日数回患部に貼付して下さい。

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させ、7歳未満の人には使用しないで下さい。
2. 患部を清潔にしてから使用して下さい。
3. 皮ふの弱い人は、同じ所に続けて使用しないで下さい。
4. 使用前に腕の内側の皮ふの弱い所に小片を貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれないことを確かめてから使用して下さい。

■成分及び分量

有効成分 1㎡中

成 分	分量	はたらき
ℓ-メントール	11.5g	知覚神経を軽くマヒさせる
ビタミンE酢酸エステル	2.5g	血行をよくする
サリチル酸グリコール	3.0g	炎症を抑え痛みをやわらげる


添加物として酸化亜鉛、ジブチルヒドロキシトルエン、生ゴム、ロジンエステル、その他1成分を含有します。

■保管及び取扱い上の注意


1. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
2. 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管して下さい。
3. 20枚入袋開封後は保存袋に入れて保管して下さい。
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

■内容量 60枚入 1枚サイズ 4.2cm×6.5cm

透けにくく目立たない




肩こり



<貼り方例>

腰痛



透けにくく目立たない



60枚
1枚サイズ
4.2cm×6.5cm

肩が固いなと思ったら

肩こり・腰痛・筋肉痛に

トクホンE



製品イメージ

酵素処理の天然ゴムで
お肌にやさしい

ℓ-メントールの
やさしい香り

モカピンクカラーだから
透けにくく目立たない

第3類医薬品

TOKUHON

特長

トクホンEは、炎症を抑え痛みをやわらげるサリチル酸グリコールにℓ-メントールと血行をよくするビタミンEを配合した微香性外用消炎鎮痛剤です。本剤は、天然ゴム(基剤成分)中に微量に含まれている皮ふ刺激成分を酵素等で除去していますので、カフシにくく肌にやさしい貼り薬です。四スミを丸くして、使用中はがれにくくしています。モカピンクカラーだから透けにくく目立ちません。

製造販売元

株式会社 トクホン

〒105-0014 東京都港区芝2-28-8
http://www.tokuhon.co.jp/

■お客様相談室 ☎0120-687-355

(受付時間9:00～12:00、13:00～17:00/土・日・祝日は除く)

製作用地産薬材制度のお問い合わせ先

(株)医薬品医薬機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkoujigai.html
☎0120-149-931

標準

倍率見本 1.00倍

