

# パンシロン。G

パンシロン。Gは、制酸、消化、健胃を目的とした胃腸薬で、次のような特長があり、各症状に対しすぐれた効き目があります。

# − パンシロン。Gは、こんな症状の方に効きます。。



- ●3種類の速効性制酸剤と1つの持続性制酸剤の配合により、胃内の酸度を早く、長く一定に整え 胃の不快感を除きます。また、ロートエキスが胃酸分泌を抑制し胸やけなどを改善します。
- ●2種類の消化酵素が消化を助け、胃腸の負担を軽くします。
- ●4種類の健胃生薬の配合により、弱った胃の働きを改善します。
- ■胃粘膜修復剤L-グルタミンが、胃の粘膜の再生を促進し、胃粘膜の修復を助けます。
- ●サッと溶けて、飲みやすい細粒状です。

# 使用上の注意



#### ■してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1. 次の人は服用しないでください。 透析療法をうけている人
- 2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。 胃腸鎮痛鎮痙薬
- 3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。 (母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある)
- 4. 長期連用しないでください。

# ■相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6) 次の症状のある人 排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人 腎臓病、心臓病、緑内障



- 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状	
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ	

- (2) 2週間位服用しても症状がよくならない場合
- 3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

#### 口のかわき

#### ■その他の注意

母乳が出にくくなることがあります。

## 効 能

胸やけ、胃痛、胃酸過多、げっぷ(おくび)、のみすぎ、はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐、胃部不快感、食べすぎ、消化不良、消化促進、食欲不振(食欲減退)、胃弱、胃もたれ、胃重、胸つかえ、胃部・腹部膨満感

## 用法・用量

次の量を食後、水又はお湯で服用してください。

_	い。全と民民、小人にの湯で加めたりで、いたという					
	年 齢	1回量	1日服用回数			
	15才以上	1包				
	11才以上15才未満	2/3包	30			
	8才以上11才未満	1/2包	3미			
	5才以上8才未満	1/3包				
	5 才未満	服用しないこと				

#### (用法・用量に関連する注意)

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分・分量

#### ●有効成分と作用(3包中)

	有効成分	配合量	作用	
粘膜修復剤	L-グルタミン	405mg	胃壁のただれや炎症に対して、胃の粘膜を修復し正常に戻す働   きをします。	
	桂皮(ケイヒ)	150mg	胃のためによい生薬で、特有の芳香性や苦みを持つ健胃生薬です。 消化液の分泌を促して、食欲の増進をはかると共に胃腸の働き	
健胃生薬	桂皮油(ケイヒ油)	6mg		
庭月土栄	縮砂(シュクシャ)	90mg	をよくします。	
	当薬(センブリ)	3mg		
7	炭酸水素ナトリウム	1950mg	胸やけなどに見られる過酸症状の緩和にすぐれた効き目のある	
	重質炭酸マグネシウム	600mg	速効性の制酸剤で、胃の中の酸度を早く一定に整え、消化剤の 働きやすい状態を作ります。	
	沈降炭酸カルシウム	300mg		
制酸剤	サナルミン	399mg	制酸効果を長く保つ持続性制酸剤で胃の中の酸度を長く一定に 整え、胃壁を保護します。	
	ロートエキス	30mg	胃液分泌抑制作用があり、制酸剤と組み合わせると胃酸中和効   果が持続します。	
消化剤	ジアスメンSS	240mg	ジアスメンSSは炭水化物(ご飯、パン、めん類など)、プロサイムはタンパク質(肉・魚など)の消化を助け胃の負担を軽く	
HILAI	プロザイム	51mg	イムはタンパン質(内・黒など)の月化を助け自の負担を軽くします。	

添加物:I-メントール、セルロース、ケイ酸AI、ステアリン酸Mg

# 保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 1包を分けて服用したときの残りは、袋の口を折り返して封をするように閉じ、2日以内に使用してください。

#### お問い合せ先;お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京: 03-5442-6020 大阪: 06-6758-1230 受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

OHTO O-ト製薬株式会社