

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

【してはいけないこと】
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと
1) 目の周囲、粘膜など
2) 瘡疹、かぶれ、傷口

【相対すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
・薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
2. 使用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛みなどの症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能又は効果】

腰痛、打撲、挫挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【成分及び分量】

有効成分 100mL中
 β-メントール・・・・・・・・・・・・・・6.0g
 サリチル酸グリコール・・・・・・・・・・3.0g
 ビタミンE酢酸エステル・・・・・・0.5g
 クロルフェニラミンマレイン酸塩・・0.1g
 ノニル酸ワニリルアミド・・・・・・12mg
 添加物としてアルコール、ハアセチルは、プロピレングリコール、水を含みます。

【保管及び取扱い上の注意】

- ① 小児の手の届かない所に保管してください。② 直射日光をさけ、キャップを閉めて涼しい所に保管してください。③ 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。④ 本剤配合のアルコールなどは、プラスチック製品や家具・調度品などの塗装を傷つけることがありますので、薬液がつかないように注意してください。⑤ 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。⑥ 火気近づけないでください。

刺激じっくりタイプ

TOKUHON

肩こり

100mL



肩こり・腰痛・筋肉痛

外用消炎鎮痛液剤
新 トクホンチール

第3類医薬品

第3類医薬品

【用法及び用量】

適量を1日数回患部に塗布してください。

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。また、刺激が強く感じられることがあるため、13歳未満の人への使用はさけてください。
2. 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐ水又はぬるま湯でよく洗い、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
3. 外用にのみ使用し、内服しないでください。
4. 入浴の1時間前には使用しないでください。使用直後に入浴すると強い刺激を感じることがあります。
5. 皮膚の弱い人は同じ所に続けて使用しないでください。
6. 使用前に腕などに少量を塗布し、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛みなどの症状がおきないことを確かめてから使用してください。
7. 塗布した所はよく乾かしてください。乾かないうちに衣類などが触れると、変色することがありますので注意してください。
8. 強い刺激を感じた場合には、よく泡立てた石鹸でやさしく患部を洗い流し、その後よく冷やしてください。

【内容量】 100mL

販売名：新トクホンチール

【お客様相談室】

☎0120-687-355

(受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00/土・日・祝日は除く)

製造販売元

株式会社 トクホン
 〒105-0014 東京都港区芝2-28-8

副作用被害救済制度
 ☎0120-149-931

刺激じっくりタイプ

TOKUHON

腰痛

100mL



■特長

すぐれた
 消炎鎮痛効果
 心地よい刺激感
 血行促進

肩こり・腰痛
 筋肉痛

第3類医薬品

外用消炎鎮痛液剤
新 トクホンチール

100mL 第3類医薬品