

おだやかな作用で良く効く便秘薬

妙

(みょうつう)

通[®]

(便秘薬)

—植物性と漢薬—

おだやかな作用の植物性と漢薬です。気持ちよく便通がつき、便秘による不快な症状もおさ
まります。小つぶの丸剤ですから服用しやすく、症状によって用量も適宜加減できます。



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
3. 大量に服用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)次の症状のある人。
はげしい腹痛、悪心・嘔吐
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

- (2)1週間位服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合
には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。

下痢

(裏面もお読みください)

成分・分量 (40丸中)



日本薬局方	アロエ末	0.40 g
〃	センナ末	0.84 g
〃	ダイオウ末	0.40 g
〃	ゲンチアナ末	0.16 g
〃	ショウキョウ末	0.24 g
	ケンゴシ末	0.15 g



添加物としてI-メントール、CMC-Ca、セルロース、ブチルパラベン、ハッカ油、薬用炭、セラックを含有します。

効 能

便秘、便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振、腹部膨満、腸内異常^(※)發酵、痔 (※發酵=はっこう)

用法・用量

年 齢	1 回
(成人) 15歳以上	10丸～20丸
11歳以上15歳未満	6丸～12丸
7歳以上11歳未満	5丸～10丸
7歳未満	服用させないこと

1日2回、朝夕の空腹時（又は食前或いは食間）に服用。


ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量または減量すること。

〔用法及び用量に関連する注意〕

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)水に濡れた手でさわらない等、水分や湿気に注意し、使用後はすぐにフタをきちんとしめること。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

製造販売元：明治薬品株式会社

電 話：☎0120-53-3451

受 付 時 間：9:00～17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先 (独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html> 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元  明治薬品株式会社 富山県富山市三郷6番地