

しっしん・かゆみに

しっしん、皮膚炎治療薬

第2類医薬品

# シオノギ®PVクリーム

## シオノギ製薬

シオノギPVクリームは、アンデラッグステロイドを含む4つの有効成分を配合し、しっしん、かゆみなどにすぐれた効きめを発揮するクリーム剤です。使用感の良いクリームタイプです。

### ……特徴……

- ◇ アンデラッグステロイドの一つである「プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル」がしっしん、かゆみなどをともなう炎症をおさえます。
- ◇ 「クロタミトン」が皮膚に軽い灼熱感を与え、かゆみをおさえます。
- ◇ 「トコフェロール酢酸エステル」が皮膚の末梢血管の血流を改善し、治療効果を高めます。
- ◇ 「イソプロピルメチルフェノール」の皮膚への殺菌作用により、二次感染による悪化を防ぎます。

### アンデラッグステロイドとは

皮膚表面の患部で効果を発揮したのち、体内に吸収されると作用の弱い物質に変化する性質をもつ成分です。



### 使用上の注意……

#### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)

#### 1. 次の部位には使用しないで下さい

- (1) 水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむしなどまたは化膿している患部
- (2) すり傷、切り傷
- (3) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分など

#### 2. 次の場合には使用しないで下さい

- (1) 美容目的の使用 (2) かぶれ防止のための化粧下、ひげそりあと
- (3) にきび (4) 赤ら顔（赤鼻）
- (5) おむつかぶれ（しっしん以外の原因によることが多い）

#### 3. 顔面には広範囲に使用しないで下さい

#### 4. 長期連用しないで下さい

よくなれば中止して下さい。だらだらと無用に長く使わないで下さい。

#### 相談すること



#### 1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談下さい

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状をおこしたことがある人
- (4) 患部が広範囲の人
- (5) 湿潤やただれのひどい人
- (6) 妊婦または妊娠していると思われる人

#### 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談下さい

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位   | 症 状                                  |
|--------|--------------------------------------|
| 皮 膚    | 発疹・発赤、かゆみ                            |
| 皮膚（患部） | みずむし・たむしなどの白せん症、にきび、<br>化膿症状、持続的な刺激感 |

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

### ……効能・効果……

しっしん、かゆみ、虫さされ、皮膚炎、あせも、かぶれ、じんましん

### ……用法・用量……

1 日数回 適量を患部に塗擦して下さい。

#### <用法・用量に関する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4) 外用にのみ使用し、内服しないで下さい。
- (5) ごしごしすりこまないで、のばすようにうすくぬって下さい。  
(あつめにぬっても効きめが高まるわけではありません)
- (6) 始めは 1 日に 2 ～ 3 回ぬり、よくなるにつれて回数をへらして下さい。
- (7) 塗擦後、その部位をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないで下さい。

### ……成分・分量……

シオノギPVクリームは、白色のクリームで、1g 中に次の成分を含有しています。


| 成 分                     | 含量 (1g 中) | はたらき                                    |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| ブレドニゾン吉草酸エステル<br>酢酸エステル | 1.5mg     | アンテドラッグステロイドの一つで、しっしん・かゆみなどをともなう炎症をおさえる |
| クロタミトン                  | 50.0mg    | 皮膚に軽い灼熱感を与え、かゆみをおさえる                    |
| トコフェロール酢酸エステル           | 5.0mg     | 皮膚の末梢血管の血流を改善し、治療効果を高める                 |
| イソプロピルメチルフェノール          | 1.0mg     | 皮膚への殺菌作用により、二次感染による悪化を防ぐ                |

添加物として ミリスチン酸イソプロピル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、濃グリセリン、パラオキシ安息香酸メチル、カルボキシビニルポリマー、水酸化ナトリウム、塩酸、精製水含有しています。

本剤は有効成分による特異なにおいを有します。

### ……保管および取扱い上の注意……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。  
(誤用の原因になったり、品質が変化します)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、使用しないで下さい。



### ……お問い合わせ先……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。  
塩野義製薬株式会社「**医薬情報センター**」  
電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450  
受付時間：9 時～17 時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

### ……包 装……

シオノギPVクリーム：10 g

®：登録商標

販売元

**塩野義製薬株式会社**

大阪市中央区道修町3丁目1番8号

製造販売元

**新生薬品株式会社**

富山県中新川郡上市町森元町7-2