

エスタック 鼻炎カプセル12

持続性鼻炎薬 花粉・ハウスダストなどによる鼻水・鼻づまり・くしゃみに

- エスタック鼻炎カプセル12は、5つの有効成分が、花粉などによるアレルギー性鼻炎や鼻かぜなどの急性鼻炎の症状によく効きます。
- はやく溶ける顆粒とゆっくり溶ける顆粒を配合した持続性製剤ですので、1日2回(朝・夕)の服用で、すぐれた効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- ① 次の人は服用しないでください
 - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 次の症状のある人。 前立腺肥大による排尿困難
 - (3) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病
- ② 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬)、塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬)
- ③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
- ④ 長期連用しないでください



相談すること

- ① 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。 緑内障
 - (8) モノアミン酸化酵素阻害剤(セレギリン塩酸塩等)で治療を受けている人。
- ② 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。



関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛
その他	排尿困難、顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合。
- ③ 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

口のかわき、便秘

効能・効果

アレルギー性鼻炎、急性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻水、鼻づまり、くしゃみ、なみだ目、頭が重い、のどの痛み

用法・用量

次の1回量を1日2回、朝夕に服用します。

年 齢	成 人 (15才以上)	7才～14才	7才未満
1回量	2カプセル	1カプセル	✕ 服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



(PTPシートの取り出し図)

成分と作用 4カプセル(成人1日量)中

成 分	4カプセル中	作 用
ブソイドエフェドリン塩酸塩	120mg	鼻粘膜の充血やはれをおさえて、鼻づまりを緩和します。
ベラドンナ総アルカロイド	0.4mg	鼻水・なみだの過剰な分泌をおさえます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	8mg	鼻水・鼻づまり・くしゃみ等のアレルギー症状をおさえます。
サイシン乾燥エキス	40mg (サイシン400mgに相当)	鼻水・鼻づまり・くしゃみ等のアレルギー症状をおさえる生薬成分です。
無水カフェイン	100mg	鼻炎に伴う頭重をやわらげます。

添加物として、CMC-Ca、ゼラチン、セルロース、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、トウモロコシデンプン、ラウリル硫酸Na、黄色5号、緑色3号を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限をすぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）