

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

患部に留まり直接効く デントヘルスR

歯ぐきの腫れ・出血・痛み、口内炎に

【特長】

デントヘルスRは歯ぐきや歯周ポケットに指で塗り込む
塗布タイプの歯肉炎・歯槽膿漏薬です。

- 歯ぐきのはれ・出血・痛み、口のねばり、口臭といった歯肉炎・歯槽膿漏の諸症状、口内炎に優れた効きめがあります。
- だ液に流されにくい滞留処方で、4つの有効成分が患部に留まり歯ぐきの奥まで浸透し、すぐれた効果を発揮します。
- 歯ぐきに塗りやすく、爽やかな使用感のゲルタイプです。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください
 - ①医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - ②本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - ③薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください
 - ①使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	味覚異常

- ②しばらく使用しても症状がよくなりえない場合

効 能

歯肉炎・歯槽膿漏における諸症状(歯ぐきの出血・発赤・はれ・うみ・痛み・むずがゆさ、口のねばり、口臭)の緩和、口内炎。

用法・用量

歯肉炎・歯槽膿漏:1日2回(朝・晩)ブラッシング後、適量(約0.3g、約1.5cm)を指にのせ、歯ぐきに塗り込んでください。
口 内 炎:1日2～4回、適量を患部に塗ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- ①小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ②歯科用にのみ使用してください。



成分 (100g中)

有効成分	含 量	はたらき
グリチルリチン酸二カリウム	0.4g	抗炎症作用により、歯ぐきのはれ・発赤を緩和します。
アラントイン	0.3g	組織修復作用により、歯ぐきからの出血をおさえます。
ヒノキチオール	0.1g	組織収斂作用により、歯ぐきをひきしめ、はれを緩和します。
セチルピリジニウム塩化物水和物	0.05g	殺菌作用により、歯周疾患の原因となる細菌の増殖をおさえます。

添加物として、カルボキシビニルポリマー、ヒプロメロース、ポビドン、アルギン酸Na、pH調整剤、グリセリン、エタノール、ポリソルベート60、ステアリン酸ソルビタン、ショ糖脂肪酸エステル、流動パラフィン、香料、L-メントールを含む。

保管及び取扱い上の注意

- ①直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)


歯槽膿漏は、はっきりとした自覚症状の少ない歯ぐきの病気で、歯を失う原因になります。症状に気づかずに、そのままほうっておくと歯ぐきが退縮し、最後には歯が抜けてしまうこともあります。

〈歯肉炎・歯槽膿漏の諸症状〉

- 歯ぐきが腫れている ●歯をみがいたときに出血しやすい
 - 疲れたときに歯ぐきがうずく(痛む) ●朝、口の中がねばつく ●うみが出て口臭が強い
- こんな症状に気づいたら大切な歯のためにデントヘルスRで早めのお手当を。



◎歯ぐきの状態と歯槽膿漏の進行(イメージ図)

健康な歯ぐき




歯と歯ぐきの間には健康な状態でも1~2mmの溝があり、ここに汚れや細菌が溜まりやすい。

歯肉炎



歯と歯ぐきの間のプラークが歯ぐきに炎症をおこし、歯周ポケットができる。

歯槽膿漏



歯周ポケットが深くなり、歯を支えている骨も溶け出し、歯ぐきは下がっていく。歯がグラグラし、最後には歯が抜ける。

歯肉炎・歯槽膿漏の予防法

- 歯と歯ぐきの境目にプラークがたまらないように丁寧にブラッシングしましょう。
- 歯科医院で定期的に歯石除去、ブラッシング指導などを受けましょう。
- 歯肉炎、歯槽膿漏は、食事や歯みがき、疲労、喫煙などの生活習慣と密接に関わりのある生活習慣病です。生活習慣を見直すことも予防には大切です。

◇歯槽膿漏の予防には[デントヘルス薬用ハミガキSP]をお使いください。

ライオン株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

お問合せ先

ライオン株式会社 お客様センター

0120-813-752

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)