

腰痛、肩こり、関節痛で
いつもお悩みの方

黄色い貼り薬

漢方中黄膏パップ

第2類医薬品

使用前にこの箱の説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痛消炎薬

漢方中黄膏パップ

第2類医薬品

特 徴

1. 本剤は四つの生薬からなる「中黄膏」を主成分としたパップ剤です。
2. ぴったりと患部にフィットします。
3. 本剤は湿潤状態を長時間保ちますので、患部の鎮痛・消炎にすぐれた効きめを発揮します。



使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないで下さい。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) しっしん、かぶれ、傷口



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

成 分・分 量

膏体100g(1200cm²)中

中黄膏……………30.0g

オウバク末……0.44g ウコン末………0.88g
ミツロウ………8.40g ゴマ油………20.28g で製した軟膏

添加物：グリセリン、天然ゴムラテックス、ゼラチン、流動パラフィン、ポリアクリル酸Na、プロピレングリコール、メチルビニルエーテル・無水マレイン酸共重合体、CMC-Na、酸化亜鉛、ステアリン酸ソルビタン、ステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、BHT、pH調節剤、パラベン

本剤は天然物(生薬)を配合しているため、製品により色調が多少異なることがあります。

効 能・効 果

捻挫、打撲
関節痛、腰痛、筋肉痛、肩こり

使 用 法

表面のポリエステルフィルムをはがして、患部に貼付して下さい。

1日1～2回使用して下さい。

必要に応じて包帯、粘着テープ等でとめて下さい。

〈使用法に関連する注意〉

- (1) 使用法を厳守して下さい。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3) 本剤を同一部位に連用する場合は、患部をよく拭いてから使用して下さい。
- (4) 患部が汗等でぬれているときは、よく拭き取ってから使用して下さい。
- (5) 衣類に付着すると黄色に着色することがありますので注意して下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、袋のチャックをきちんと閉めて保管して下さい。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電 話 03(5205)8331
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

販売元 第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10
<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

製 造 救急薬品工業株式会社
販売元 富山県射水市戸破32-7

12枚入(6枚×2袋)

使用期限

製造番号



開
封
口