

BUFFERIN PREMIUM

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に、あるよう大正に保存してください。

つらい頭痛に 速効・すぐれた効き目 (頭痛・熱)

(解熱鎮痛薬) **バッファリンプレミアム** 第2類医薬品

バッファリンには有効成分の異なる製品があります。本品の解熱鎮痛成分はイブプロフェン・アセトアミノフェンです。医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談する場合は、イブプロフェン・アセトアミノフェンとお伝えください。

— BUFFERIN プレミアム処方 —

頭痛によく効く4つの成分※1

胃を守る成分

クイックアタック錠※2

飲みやすい小粒の錠剤

※1 効果・効能は、頭痛・熱など。※2 イブプロフェンを速く追加します。

△ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事象が起こりやすくなる)

- 次の人は服用しないでください
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - 15才未満の小児。
 - 出産予定日12週以内の妊婦。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります。)
- 服用前後は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください



📞 相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 授乳中の人。
 - 高齢者。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病
 - 次の病気にかかったことのある人。胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン氏病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、青あざができる
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃痛、胃部不快感、口内炎、胸やけ、胃もたれ、腹痛、下痢、血便、胃腸出血
精神神経系	めまい
循環器	動悸
呼吸器	息切れ
その他	目のかすみ、耳なり、おくみ、鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、背中の痛み、過度の体温低下、からだがだるい

(必ず裏面もお読みください)

症状の名称	症状
皮膚炎（かぶれ）	発疹後には液瘡の出るが、じつはもともと痒いので掻きむしりておこすものである。この病に罹ると全身の皮膚があらわれる。
急性出血性坏死性肺炎	高熱、目の充血、目やに、唇咽にたれのどの痛み、皮膚の小紅斑の発疹、鼻赤、また等々で皮膚上に小さなブツブツと小膿疱が出る。全身から汗を流すが直感がない等がある。死に至る。
用機能障害	発熱、吐瀉、発疹、黄白皮膚下目に黄色く出る。褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	頻尿、腰痛、尿量の減少などあるが、全身のだるさ、頭痛、血圧の上昇などがあらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し歩いただけですぐ息切れをする・息苦しくなる、生ぜき、痰等が見られ、これらが急にあらわれたりする。
細菌性髄膜炎	首すじのうしろ側をうつむくと激しい痛み、頸硬（けいつこう）、嘔吐等の症状があらわれる。このような場合は、骨髄腔内にエリデマイドス又は屈臣氏総合鎮静剤の点滴を受けている人で多く報告されている。
ぜんそく	息苦すとせーせー、ピューピューと鳴る。息苦しさがあられる。
再生不良性貧血	青灰色顔面、蒼白色の出面、発熱、皮膚粘膜が青紫になる、動悸、易疲労、息切れ、気分が悪くなり力が出なくなる。血尿等があらわれる。
銀顆粒毒症	突如との自覚なく、のどの痛み等があらわれる。

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 頭痛・肩こり痛・月経痛(生理痛)・腰痛・関節痛・神経痛・筋肉痛・目眩痛・歯痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・むねざ痛・骨折痛・外傷痛・耳痛の鎮痛 (2) 悪寒・発熱時の解熱

なるべく空腹時を過ぎて、服用時間は4時間以上おいてください。

次の量を水又はぬるま湯にて服用してください。

年 齢	成人(15才以上)	15才未満
1回量	2錠	服用しないこと
1日服用回数	3回 毎食後とする	×

おしだす

有効成分	含 量	はたらき
イブプロフェン	65mg	痛みをおさえると同時に、熱を下げます。
アセトアミノフェン	65mg	
酢水カルバマゼピン	40mg	痛みをおさえる働きを助け、頭痛をやわらげます。
アリルイソプロピルアセチル尿素	30mg	
胃酸分泌抑制薬（アルミニウム塩）	95mg	胃粘膜を保護し、胃が荒れるのを防ぎます。

保管及び取扱以上の注意

- 1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- 3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- 4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 5) 変質の原因となりますので、服用なさらない錠剤の裏のアルミ箔に傷をつけないようにしてください。

■お問合せ先 お買い求めのお店又は下記にお問合せください
 ライオン株式会社 お客様センター 0120-813-752
 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社
 〒130-8644 東京都葛飾区本所1-3-7
 詳しい製品情報は www.buierin.net/