

心臓の衰弱、貧血症

神 心

神心は、江戸時代の医家である原南陽が著した『叢桂亭医事小言』に記載されている「しん しやうとう 鍼砂湯」を基本とした製剤です。

「しん しやうとう 鍼砂湯」は漢方医学の原典『傷寒論』、『きん ぎ しょうやく 金匱要略』に記載されている「しん けい じつ とう 苓桂朮甘湯」にニンジン、ボレイ、しん せう 鍼砂（鉄粉）を加えた薬方で、貧血があり、心臓の衰弱時のどうきや息切れ、めまい、むくみなどがある場合に用いられます。

神心は、この「しん しやうとう 鍼砂湯」を構成する生薬にシソシ、セキイ、モッコウ、カンキョウなどを配合した製剤で、循環、補血、利尿、滋養などの作用により体のさまざまな機能を整えて、心臓の衰弱や貧血症に効果を現します。

神心は、次のような症状を目標として使用すると、すぐれた効きめを発揮します。

◇貧血によりどうきや息切れがする……

◇貧血気味でめまいや立ちくらみなどを起こしやすい……

◇心臓の衰弱により、体がむくんだり、顔色が悪い……

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる〕

1. 次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児

2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと

他の貧血用薬



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 妊婦または妊娠していると思われる人

(3) 高齢者

(4) 本人または家族がアレルギー体質の人

(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

(6) 次の症状のある人

むくみ

(7) 次の診断を受けた人

高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師または薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師または薬剤師に相談すること

4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること

便秘、下痢

効 能

心臓の衰弱、貧血症

用法・用量

食間に水またはお湯で服用すること

年 齢	1 回 量	服用回数	— 食間とは… — 食後2～3時間を 指します。
大人（15才以上）	1 包	1日3回	
7～14才	1/2包		
4～6才	1/3包		
2～3才	1/6包		
2才未満	1/10包		

- (1) 服用の前後30分はお茶・コーヒー等を飲まないこと
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
(3) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること

成 分

3包（1包2g）中、下記生薬を含有します。

ケイヒ	1.071g	カンゾウ	1.071g	ニンジン	0.375g
ボレイ	1.071g	ブクリョウ	0.375g	セキイ	0.375g
シソシ	0.375g	ビャクジュツ	0.375g	モッコウ	0.375g
カンキョウ	0.375g	鉄 粉	0.161g		

添加物は含有しておりません。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
(2) 小児の手の届かない所に保管すること
(3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）
(4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること
(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと
☆本剤は天然の生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異を生ずることがありますが、品質には変わりありません。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。
救心製薬株式会社 お客様相談室
電話：03-5385-3211（代表）
受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

発売元 救心製薬株式会社
東京都杉並区和田1-21-7

製造販売元 株式会社 建林松鶴堂
埼玉県戸田市戸田公園3-7